アプロード水和剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（L/10a）	使用時期	使用方法	使用回数 本剤	使用回数 ブプロフェジンを含む農薬の総使用回数
みかん	カイガラムシ類幼虫	1000～1500	200～700	収穫14日前まで	散布		3回以内
	ミカントゲコナジラミ若齢幼虫	1000					
すだち	カイガラムシ類幼虫	1000～1500		収穫45日前まで			
	ミカントゲコナジラミ若齢幼虫	1000					
	ミカンネコナカイガラムシ						
かんきつ（みかん、すだちを除く）	カイガラムシ類幼虫	1000～1500					
	ミカントゲコナジラミ若齢幼虫	1000	5L/㎡		土壌灌注		
なし	カイガラムシ類幼虫	1000	200～700	収穫30日前まで	散布	2回以内	2回以内
もも				収穫14日前まで		3回以内	3回以内
かき				開花期まで 但し、収穫45日前まで		2回以内	2回以内
うめ				収穫後～落葉前			
くり				収穫7日前まで			
すもも びわ				収穫14日前まで			
キウイフルーツ				収穫前日まで			
	キウイヒメヨコバイ						
稲	ツマグロヨコバイ幼虫 ウンカ類幼虫	1000～2000	60～150	収穫7日前まで		4回以内	4回以内（小包装投入は1回以内）
		300	25				
小麦	ヒメトビウンカ幼虫	1000～2000	60～150			3回以内	3回以内
きゅうり	オンシツコナジラミ幼虫	1000～2000	100～300	収穫前日まで			3回以内
トマト							
	タバココナジラミ類幼虫（シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む）	1000					
なす	チャノホコリダニ幼虫						
	オンシツコナジラミ幼虫	1000～2000					
ふき	タバココナジラミ類幼虫（シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む）	1000		収穫21日前まで			
さんしょう（果実）	カイガラムシ類幼虫		200～700	収穫３日前まで		１回	１回
茶	クワシロカイガラムシ若齢幼虫 チャノミドリヒメヨコバイ幼虫 チャトゲコナジラミ		1000	摘採14日前まで		2回以内	2回以内
			200～400				
桑	ヒシモンヨコバイ幼虫 ハゴロモ類幼虫		200～700	発生初期		4回以内	4回以内
たばこ	オンシツコナジラミ幼虫	2000	２５～180			2回以内	2回以内
ポインセチア		1000～2000	１００～３００			6回以内	6回以内
	タバココナジラミ類幼虫（シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む）	1000					
ガーベラ	オンシツコナジラミ幼虫	1000					