

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	下記成分を含む農薬の 総使用回数		使用 方法								
						フェンピロキシ メート	ブプロフェジン									
みかん	カイガラムシ類	1000	200～700	収穫14日前まで	2回以内	2回以内	3回以内	散布								
	ミカンサビダニ	1000～2000														
	チャノホコリダニ	2000		収穫45日前まで					2回以内	2回以内	3回以内					
かんきつ (みかんを除く)	カイガラムシ類	1000														
	ミカンサビダニ	1000～2000														
	チャノホコリダニ	2000														
なし	ニセナシサビダニ	1000		収穫30日前まで	1回	1回	2回以内									
	カイガラムシ類															
ぶどう	ブドウハモグリダニ															
	カイガラムシ類				収穫7日前まで	2回以内			2回以内	3回以内						
収穫14日前まで				1回			1回				2回以内					
						キウイフルーツ			キウイヒメヨコバイ			収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内	
				すいか メロン	コナジラミ類		1000～2000				1000					2回以内
トマト										トマトサビダニ						
				なす	チャノホコリダニ		1000				2回以内					2回以内
とうがらし類						コナジラミ類			1000～2000	2回以内		2回以内	2回以内			
きゅうり																
茶	カイガラムシ類	1000	1000	摘採14日前まで	2回以内	2回以内	2回以内									
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ チャトゲコナジラミ		200～400													
ポインセチア ガーベラ	コナジラミ類		100～300	発生初期	6回以内	6回以内	6回以内									
しきみ	シキミハリナガフシダニ		100～700		2回以内	2回以内	6回以内									