エルサン乳剤		36 min leb ster	10a当り				DA
作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量(L)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	PAF の
稲	ニカメイチュウ第1世代	1000~1500	60~150	収穫7日 前まで	2回以内		
	ニカメイチュウ第2世代 サンカメイチュウ第3世代 ツマグロヨコバイ	800~1000					
	ヒメトビウンカ イネヒメハモグリバエ	1500~2000					
	カメムシ類 アブラムシ類 フタオビコヤガ	1000					
	イネドロオイムシ	1000~2000					
	イネハモグリバエ アブラムシ類	2000					
小麦	ムギクロハモグリバエ アワヨトウ ムギキモグリバエ						
< 9	モモノゴマダラノメイガ クリイガアブラムシ カツラマルカイガラムシ 若齢幼虫 クスサン	1000			4回以内		
	ヤノネカイガラムシ アブラムシ類	1000~1500		0~700 収穫14日 前まで			
かんきつ	ミカンサビダニ ミカントゲコナジラミ ミカンコナジラミ ハマキムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類 (ヤノネカイガラムシを除く) カメムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンバエ成虫	1000	200~700				
キャベツ カリフラワー	アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ	1000~2000			2回以内		
	ョトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンョトウ	1000					
	アザミウマ類 コナガ	1000~1500	-				
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ	1000~2000		収穫30日 前まで			
	ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類	1000					
	コナガ アオムシ	1000~1500					
はくさい	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ	1000~2000		収穫21日 前まで	3回以内		
	ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類	1000					
	コナガ	1000~1500			1回		
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	1000~2000					
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000				_	
だいこん	アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイカ キスジノミハムシ	1000~2000		収穫30日 前まで	2回以内		
	ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類	1000					
	コナガ アオムシ	1000~1500					
かぶ	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ	1000~2000					
	ョトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類	1000					
	コナガ ダイコンハムシ	1000~1500					
	オオニジュウヤホシテントウ	1000~2000					
レタス	アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000	-	収穫21日 前まで			
すいか しろうり	アブラムシ類	1000~2000	<u> </u>		3回以内		
かぼちゃ	アザミウマ類	1000	 	収穫3日 前まで	O티쓰인	. 散布	
まくわうり メロン	アブラムシ類 アザミウマ類	1000~2000 1000	-		4回以内		
ごぼう	アブラムシ類	1000~2000		収穫7日 前まで	3回以内		
にんじん	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000		収穫90日 前まで			
ねぎ	アブラムシ類	1000~2000	100~300	1回 収穫21日 前まで	1回		
	アザミウマ類	1000					

Pを含む農薬 総使用回数

2回以内

4回以内

2回以内

3回以内

1回

2回以内

3回以内

4回以内

3回以内

1回

2回以内

4回以内

2回以内

1回

2回以内

1回

4回以内

2回以内

4回以内

3回以内

2回以内

4回以内

収穫7日 前まで

収穫14日

前まで

収穫7日

前まで

収穫21日

前まで

収穫7日

前まで

収穫28日

前まで

収穫14日

前まで

収穫3日

前まで

収穫14日

前まで

収穫7日

前まで

最終摘採後 から冬期ま

で

摘採15日

前まで

萌芽前まで

1000

200~400

100~300

120

2回以内

4回以内

2回以内

1回

2回以内

1回

4回以内

2回以内

4回以内

3回以内

2回以内

4回以内

アブラムシ類

アザミウマ類

ヒルガオハモグリガ

ハスモンヨトウ ナカジロシタバ

アブラムシ類

ニジュウヤホシテントウ

ヨトウムシ

ハスモンヨトウ

アブラムシ類

ハスモンヨトウ

アブラムシ類

マメシンクイガ

カメムシ類

ハスモンヨトウ ツメクサガ

シロイチモジマダラメイガ

アブラムシ類

アズキノメイガ

マメホソクチゾウムシ

アブラムシ類

フキノメイガ

インゲンテントウ

アブラムシ類

エンドウハモグリバエ

ヨトウムシ

ハスモンヨトウ

アブラムシ類

フキノメイガ

インゲンテントウ

アブラムシ類

エンドウハモグリバエ

ョトウムシ ハスモンヨトウ

アザミウマ類

ジュウシホシクビナガハムシ

アワノメイガ

アブラムシ類

クワシロカイガラムシ

チャドクガ

コカクモンハマキ

キクヒメヒゲナガアブラムシ

クワノメイガ

ハゴロモ類

ヒシモンヨコバイ

クワシロカイガラムシ

ヒメコシンクイ

クワヒメゾウムシ

カミキリムシ類

たまねぎ

かんしょ

ばれいしょ

さといも

豆類(種実、ただし、 らっかせい、だいず、

あずき、いんげんま

め、えんどうまめを除

だいず

あずき

いんげんまめ

えんどうまめ

未成熟そらまめ

さやいんげん

さやえんどう

わけぎ

アスパラガス

とうもろこし

食用ゆり

茶

きく

桑

1000~2000

1000

1000~2000

1000

1000~2000

1000

1000~2000

1000

1500~2000

1000~2000

1000

1000~2000

1000

1000~2000

1000~1500

1000

1000~2000

1000

1000~2000

1000~1500

1000

1000~1500

1000~2000

1000~1500

1500~2000

1000

1200

200~300