

カスケード乳剤								
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数	
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000倍	200～700	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	キンモンホソガ キンモンハモグリガ	2000～4000倍						
	ハマキムシ類	2000～6000倍						
	ヨモギエダシャク	4000倍						
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000倍						
	ハダニ類	2000～4000倍						
ハマキムシ類	4000倍							
モモハモグリガ	2000～4000倍							
小粒核果類	ケムシ類	2000～4000倍						
ネクタリン	ハダニ類							2000倍
	ハマキムシ類							4000倍
	モモハモグリガ	2000～4000倍						
おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000倍						
かんきつ	ヨモギエダシャク							
	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ		2000～4000倍					
	ミカンハダニ	1000～2000倍						
かき	カキノヘタムシガ ケムシ類 ハマキムシ類 カキクダアザミウマ	2000～4000倍						
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍						
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000倍						
キャベツ	コナガ アオムシ タマナキンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ ハイマダラノメイガ アザミウマ類 オオタバコガ	2000～4000倍	100～300	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		
	16～24倍	0.8～1.6						
	32倍	1.6～3.2						
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000～4000倍	100～300	2回以内	2回以内	無人航空機による散布		
	16～24倍	0.8～1.6						
	32倍	1.6～3.2						
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	2000～4000倍	100～300	収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布		
	16～24倍	0.8～1.6						
	32倍	1.6～3.2						
はつかだいこん		4000倍	100～300	1回	3回以内	1回		
わさびだいこん	コナガ	2000～4000倍						
非結球あぶらな科 葉菜類 (なばな類を除く)	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000倍					2回以内	2回以内
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍						
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 ヨトウムシ	4000倍	1.6	2回以内	2回以内	無人航空機による散布		
	32倍							
	64倍	1.6～3.2						
レタス 非結球レタス くちしや	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ	4000倍	100～300	収穫3日前まで	3回以内	3回以内		
トマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類							
	マメハモグリバエ オオタバコガ						2000～4000倍	
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍						
ミニトマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000倍	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内		
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000～4000倍						
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍						
なす	マメハモグリバエ ハダニ類	2000倍	2000～4000倍	4回以内	4回以内	4回以内		
	ミナミキイロアザミウマ カメムシ類 オオタバコガ							
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000倍	100～300	3回以内	3回以内	3回以内		
ししとう	オオタバコガ	2000倍						
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000倍						
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、 セルリーを除く) ゆきのした ぶだんそう モロッコ 食用なでしこ 食用ペンタス	ハスモンヨトウ		2回以内	2回以内	2回以内	2回以内		
パセリ							1回	1回
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ		3回以内	3回以内	3回以内	3回以内		
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ		2000倍	2回以内	2回以内	2回以内		
たまねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ		4000倍	3回以内	3回以内	3回以内		
にら	アザミウマ類		4000倍	2回以内	2回以内	2回以内		
オクラ	オオタバコガ ハスモンヨトウ		2000～4000倍	2回以内	2回以内	2回以内		
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類		4000倍	1.6	3回以内	3回以内	無人航空機による散布	
	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ		64倍					3.2
いちご	ハスモンヨトウ アザミウマ類 クロバネキノコバエ類		4000倍	100～300	収穫前日まで	4回以内	4回以内	
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ		2000～4000倍					
	ウリノメイガ トマトハモグリバエ		2000倍					
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ		2000～4000倍	4000倍	2回以内	2回以内	2回以内	
	シロイチモジヨトウ							
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000～4000倍	2000倍	3回以内	3回以内	3回以内		
	タバココナジラミ類(シル バーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ							
かぼちゃ	トマトハモグリバエ	16倍	0.8	収穫前日まで	2回以内	無人航空機による散布		
	16～32倍	1.6						
	32～64倍	3.2						
うり類(漬物用) (しろうり、とうがらんを 除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000倍	100～300	1回	3回以内	1回		
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ							
とうがらん	ミナミキイロアザミウマ							
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000～4000倍	4回以内	4回以内	4回以内			
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000倍	2回以内	2回以内	2回以内			
未成熟とうもろこし	ツマジロクサヨトウ アワノメイガ	2000～4000倍	25	4回以内	4回以内	無人航空機による散布		
	オオタバコガ	4000倍						
てんさい	ツマジロクサヨトウ アワノメイガ	2000～4000倍	1.6	4回以内	4回以内	無人航空機による散布		
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	4000倍						
	ヨトウムシ	1000倍						
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000倍	100～500	収穫前日まで	2回以内	2回以内		
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～4000倍	100～300	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナゴコナダニ アシグロハモグリバエ	4000倍	100～300	2回以内	2回以内	2回以内		
	ハスモンヨトウ	4000倍						
そらまめ 未成熟そらまめ	マメハモグリバエ	2000倍						
さやいんげん	ハスモンヨトウ	4000倍						
	マメハモグリバエ	2000倍						
さやえんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000倍	100～300	2回以内	2回以内	2回以内		
実えんどう	4000倍							
未成熟さざげ つるむらさき	ハスモンヨトウ							
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000倍	100～300	2回以内	2回以内	2回以内		
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ マジンクイガ カメムシ類 ハダニ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタバエ ツメクサガ	32倍	0.8	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		
	4000倍							
あずき	ハダニ類 アズキノメイガ ハスモンヨトウ	4000倍	100～300	2回以内	2回以内	無人航空機による散布		
	16～32倍	0.8						
	32～64倍	1.6						
みょうが(莖菜)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍	100～300	3回以内	3回以内	3回以内		
	2000倍							
みょうが(花穂)	みょうが(花穂)の収穫前日まで但し、花穂を収穫しない場合は開花期終了まで	2000倍	100～300	3回以内	3回以内	無人航空機による散布		
	3回以内							
しそ科葉菜類(バ ジルを除く) タラゴン 食用トレンシア	ハスモンヨトウ	4000倍	100～300	2回以内	2回以内	2回以内		
	バジル							
	にんじん							
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	16～32倍	0.8	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布		
	32～64倍	1.6						
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ	2000倍	200～700	2回以内	2回以内	2回以内		
きく(菜)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	4000倍						
食用ぎく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍						
食用さくら(菜)	アザミウマ類	4000倍						
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノドリヒメコバ チャハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカシミカメ チャトゲコナジラミ	4000倍	200～400	摘採7日前まで	3回以内	3回以内		
	2000倍							
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍	100～300	発生初期	3回以内	3回以内		
ばら	ハダニ類	1000倍	100～300	2回以内	2回以内	2回以内		
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍						
さつき	ツツジゲンバイ チュウレンジハバチ	4000倍	100～300	2回以内	2回以内	2回以内		
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ							
スターチス	ハスモンヨトウ	2000倍						
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300	2回以内	2回以内	2回以内		
宿根アスター	シロイチモジヨトウ							
はぼたん	コナガ	2000倍	100～300	2回以内	2回以内	2回以内		
けいとう	シロオビノメイガ							
カーネーション ほおずき	タバコガ	4000倍	100～700	2回以内	2回以内	2回以内		
りんどう	リンドウホソハマキ							