

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソキサチオンを含む農薬の総使用回数
みかん	ゴマダラカミキリ成虫	1500	200～700L/10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内
	カイガラムシ類 ミカンハモグリガ コカクモンハマキ クワゴマダラヒトリ若齢幼虫 ミカンサビダニ	1000～1500					
	コナカイガラムシ類 ミノガ類 ケシキスイ類	1000					
	カネタタキ	5000					
とうもろこし(子実)	アワノメイガ	1000	100～300L/10a	収穫21日前まで	2回以内	回以内	
キャベツ	アオムシ コナガ	1500～2000			1回	灌注	1回
いちご(仮植床)	コガネムシ類幼虫	1000～1500	3L/m ²	植付後			
たまねぎ	タマネギバエ	500～1000	育苗箱(約30×60×2.5cm、使用土壌約2L)1箱当り500ml	定植前	土壌灌注		
さとうきび	アオドウガネ幼虫	1000	1.8L/m ²	夏季生育期まで	3回以内	12時間 種苗浸漬	5回以内 (種苗浸漬は1回以内、 植付時の土壌混和は 1回以内、 植付後は3回以内)
	ハリガネムシ類		—	植付前	1回		
茶	コカクモンハマキ チャノホソガ ヨモギエダシヤク チャノホコリダニ	1500	200～400L/10a	摘採21日前まで	1回		1回
	クワシロカイガラムシ		1000L/10a				
花き類・観葉植物 (きく、ガーベラ、 シクラメン、 アジアンタムを除く)	オンシツコナジラミ若齢幼虫	1000	100～300L/10a		4回以内		4回以内
きく ガーベラ	マメハモグリバエ						
樹木類 (まさき、もっこく、 さくらを除く)	カイガラムシ類 ケムシ類						
まさき	ユウマダラエダシヤク						
もっこく	モッコクハマキ	200～700L/10a		発生初期	6回以内	散布	6回以内
さくら	カイガラムシ類 ケムシ類						
	クビアカツヤカミキリ						
たばこ	ジャガイモガ	1000	100～180L/10a		2回以内		2回以内
	タバコガ ヤサイゾウムシ	1000～1500					
	ヨトウムシ	1500～2000					
芝	チガヤシロオカイガラムシ	1000	0.5L/m ²		6回以内		6回以内
	スジキリヨトウ シバツトガ		0.5～2L/m ²				
	シバオサゾウムシ ケラ コガネムシ類 タマナヤガ幼虫		1～2L/m ²				