

作物名	適用場所	適用書名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数					
稲	-	カメムシ類	2000倍	60～150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)					
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000倍										
水田作物 畑作物(休耕田)	30シ、オキ、ススキ、セイフアゲツ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類			-								
とうもろこし(子実)	-	ムギクビレアブラムシ カメムシ類		100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内					
未成熟とうもろこし		アブラムシ類 カメムシ類											
もも ネクタリン		モモチョッキリゾウムシ アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類	2000倍										
おうとう		オウトウシヨウジョウハエ カメムシ類		200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(塗布は1回以内、散布は3回以内)					
かき		カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキハヘタムシガ アザミウマ類											
マンゴー		チャノキイロアザミウマ											
小粒核果類		アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類											
オリーブ		カメムシ類											
オリーブ(葉)									収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
ぶどう		カメムシ類 ブドウトラミキリムシ							200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内(塗布は1回以内)
		フタテンヒメヨコバイ	3000倍										
		チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～2000倍										
あけび(果実)		カメムシ類	2000倍							収穫14日前まで	2回以内	2回以内	2回以内
キウイフルーツ		カメムシ類	1000～2000倍							3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
びわ		カメムシ類 ビワキジラミ								2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
りんご		アブラムシ類 キンモンホソガ シンクイムシ類 ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類	2000倍							収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内
なし		アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 チュウゴクナシキジラミ								3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	50倍	100mL/株						育苗期	5回以内	株元灌 注	5回以内	
かんきつ	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a						収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	ゴマダラカミキリ	1000倍											
ばれいしょ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 ミカンハエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノドリヒメヨコバイ アオハハゴロモ	2000倍		収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内						
	ワタアブラムシ		100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内						
	アブラムシ類 コナジラミ類			収穫3日前まで	1回		1回						
	カメムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内		5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)						
コナジラミ類	2000～3000倍			2回以内									
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L	鉢上時又は定植時	1回	灌注	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)						
はくさい	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は1回以内、散布は2回以内)						
	キスジノミハムシ ダイコンハムシ	2000倍											
ピーマン なす	コナジラミ類	2000～3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)						
	アブラムシ類	3000倍											
すいか	アザミウマ類 カメムシ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)						
とうがらし類	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	アザミウマ類 ナスミハエ	2000倍		収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
とうがらし(葉)	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	アザミウマ類	2000倍											
かぼちゃ	アブラムシ類	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L	定植前日～定植時	1回	灌注	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は1回以内、散布は2回以内)						
	コナジラミ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
にがうり	アブラムシ類	2000倍		収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	コナジラミ類 アザミウマ類			収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
ズッキーニ	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	コナジラミ類 アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)						
きゅうり	アザミウマ類 ウリハムシ カメムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	3000倍					2回以内						
メロン	コナジラミ類	2000～3000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)						
	アザミウマ類	2000倍											
アブラムシ類	アブラムシ類	3000倍											
	アザミウマ類	2000倍											
キャベツ	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	50～100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約0.5L)	定植前日～定植時	1回	灌注	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)						
だいこん	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶性剤の散布は1回以内、散布及び無人航空機散布合計2回以内)						
	キスジノミハムシ ダイコンハムシ	1000倍 2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)						
わさび	アブラムシ類 ナトビハムシ	2000倍		畑育苗期	3回以内	散布	3回以内						
	アブラムシ類	3000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)						
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ	50倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約0.5L)	定植前日～定植時	1回	灌注	4回以内(は種時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類 ナモグリハエ	50～100倍		定植前日～定植時	1回	灌注	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元散布は1回以内、生育期の無人航空機散布及び定植後の株元散布は2回以内)						
ねぎ	アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)						
	アザミウマ類	400倍	0.4L/㎡	生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元灌 注	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)						
わさび	アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)						
	アザミウマ類	400倍	0.4L/㎡	生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元灌 注	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)						
にんじん	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)						
	トビロヒョウタンゾウムシ	400倍	0.4L/㎡	生育期 但し、収穫21日前まで	1回	株元灌 注	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)						
しゅんぎく	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(但し、は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)						
	キスジノミハムシ アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(但し、は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)						
チンゲンサイ	アブラムシ類	3000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内						
ほうれんそう	アブラムシ類 ウリハムシモドキ	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	3000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内						
非結球あぶらな科 葉菜類(チンゲンサイ、畑わさびを除く) なばな かぶ	キスジノミハムシ	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
畑わさび	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内						
	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内						
だいず	カメムシ類 ダイサヤタマハエ	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内						
あずき	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内						
	アブラムシ類	3000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内						
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、美えんどう、未成熟さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	アブラムシ類 ハモグリハエ類	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布は合計2回以内)						
	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
えだまめ	カメムシ類 アブラムシ類 ハモグリハエ類 ダイサヤタマハエ	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布は合計2回以内)						
	アブラムシ類	3000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
未成熟さやえんどう	アブラムシ類 ハモグリハエ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
さいやいんげん	アブラムシ類 ハモグリハエ類 カメムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
モロヘイヤ	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
オクラ	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
しょうが	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
らっきょう	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
にら	ネギアザミウマ	400倍	0.4L/㎡	生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元灌 注	3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
アスパラガス	アザミウマ類 ジュウシホシヒナガハムシ コナジラミ類 カメムシ類	2000倍	100～800L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内						
	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内						
てんさい	アブラムシ類 テンサイモグリハナハエ	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)						
	カメムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内						
きく	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍	5L/ペーパーポット16冊(2.5L/㎡)	移植前	1回	灌注	3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内)						
	アブラムシ類	2000倍	6L/ペーパーポット16冊(3L/㎡)	移植前	1回	灌注	3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内)						
きゅうり(葉)	アブラムシ類	2000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内						
きゅうり(花)	コナジラミ類 アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
パジル	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
しそ科葉菜類(しそ、パジルを除く) しそ(花種)	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内						
しよくようほおずき 食用カネーネ 食用金魚草 食用ベンジー 食用トレンゴ 食用なでしこ 食用アムラムラ 食用エキサガム 食用せんごちろう	アブラムシ類 コナジラミ類	3000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内						
食用コスモス	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内						
食用ぎく	アブラムシ類	2000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内						
しそ	アブラムシ類 ウリハムシモドキ	2000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)						
なんてん(葉)	アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内						
すいぜんじな	アブラムシ類	2000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内						
アマランサス(莖葉)	アブラムシ類	2000倍		収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内						
ふき	コナジラミ類	2000倍		収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)						
せり	水田												
せり(水耕栽培)	ガラス室等の施設	アブラムシ類			収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内					
茶	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカシマカメ コミカンアブラムシ	2000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	1回	株元灌 注	2回以内						
	アブラムシ類 カンシャコバネナガカメ ムシ サトウキビモチアザミウ マ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	5回以内(粒剤は2回以内、液剤、水溶性剤及び水剤は3回以内)						
いね科牧草	アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内						
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍	1L/㎡	収穫前日まで	2回以内	灌注	3回以内						
	ハモグリハエ類	1000倍	1L/㎡	発生初期	2回以内	灌注	3回以内						
きく	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内(土壌混和は1回以内)						
	カメムシ類	2000倍		発生初期	5回以内	灌注	5回以内						
樹木類(つじ類、つばき類を除く)	ケムシ類	2000倍	100～700L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内						
つばき類	チャドクガ	100倍	0.5～2L/樹(但し、220L/10aまで)		2回以内	株元灌 注	5回以内(株元灌注は2回以内)						
つつじ類	ツツジゲンバイ ケムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内						
いばさ	イグサシンムシガ	1000倍	100～150L/10a		2回以内	散布	2回以内						