

| スタークル粒剤                         |  |                              |   |                   |                        |   |   |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------|------------------------|---|---|
| 作物名                             | 適用害虫名  | 使用量                          | 使用時期                                      | 本剤の使用回数           | 使用方法                   | ジノテフランを含む農薬の総使用回数   |   |
| 稲                               | ウンカ類<br>ツマグロヨコバイ<br>ニカメイチュウ<br>イネドロオイムシ<br>カメムシ類<br>イネミズゾウムシ | 3kg/10a                      | 収穫7日前まで                                   | 3回以内              | 散布                     | 4回以内<br>(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)                               |   |
| きゅうり                            | ハモグリバエ類  | 2g/株                         | 育苗期                                       | 1回                | 株元散布                   | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)                               |   |
|                                 | コナジラミ類   | 1~2g/株                       |   |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類   | 1g/株                         |   |                   |                        |   |   |
|                                 | ハモグリバエ類<br>アザミウマ類  | 2g/株                         | 定植時                                       |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類<br>コナジラミ類   | 1~2g/株                       | 生育期 但し、<br>収穫開始14日前まで                     | 株元散布              |                        |   |   |
|                                 |  | 1g/株                         |   |                   |                        |   |   |
| うり類<br>(漬物用)                    | アザミウマ類   | 2g/株                         | 定植時                                       | 1回                | 株元散布                   | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)   |   |
|                                 | アブラムシ類<br>コナジラミ類   | 1~2g/株                       |   |                   |                        |   |   |
| にがうり                            | コナジラミ類   | 2g/株                         | 育苗期                                       | 1回                | 株元散布                   | 3回以内<br>(株元散布及び定植時の土壌混和合計1回以内、散布は2回以内)  |   |
| メロン                             | ハモグリバエ類  | 2g/株                         |   |                   |                        |   |   |
|                                 | コナジラミ類   | 1~2g/株                       |   |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類   | 1g/株                         |   |                   |                        |   |   |
|                                 | ハモグリバエ類<br>アザミウマ類  | 2g/株                         | 定植時                                       | 株元散布              |                        |   |   |
|                                 |  | コナジラミ類                       |   |                   |                        |   | 1~2g/株  |
|                                 |  | アブラムシ類                       |   |                   |                        |   | 1g/株  |
| すいか                             | ワタアブラムシ  | 2g/株                         | 生育期 但し、<br>収穫21日前まで                       | 1回                | 株元散布                   | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)                               |   |
|                                 |  |                              | 育苗期                                       |                   |                        |   |   |
| かぼちゃ                            | アブラムシ類<br>コナジラミ類   | 1g/株                         | 定植時                                       | 1回                | 株元散布                   | 3回以内<br>(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)  |   |
| ズッキーニ                           | アブラムシ類   |                              | 生育期 但し、<br>収穫開始14日前まで                     |                   |                        |   |   |
| トマト<br>ミニトマト                    | コナジラミ類   | 培土1L当り10g                    | は種前                                       | 1回                | 培土混和<br>株元散布<br>植穴土壌混和 | 5回以内<br>(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)               |   |
|                                 | ハモグリバエ類<br>コナジラミ類  | 1~2g/株                       | 育苗期                                       |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類   | 1g/株                         | 定植時                                       |                   |                        |   |   |
| とうがらし類                          | コナジラミ類<br>アブラムシ類   |                              | 1g/株                                      | 生育期 但し、<br>収穫前日まで | 2回以内                   | 株元散布  | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
|                                 | アザミウマ類   | 1~2g/株                       | 定植時                                       |                   |                        |   |   |
| とうがらし(葉)                        | アブラムシ類   | 1g/株                         | 生育期 但し、<br>収穫開始14日前まで                     | 1回                | 株元散布                   | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)   |   |
|                                 |  |                              | 定植時 但し、<br>収穫30日前まで                       |                   |                        |   |   |
| なす                              | ハモグリバエ類  | 2g/株                         | 育苗期                                       | 1回                | 株元散布                   | 3回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)                               |   |
|                                 | コナジラミ類   | 1~2g/株                       |   |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類   | 1g/株                         |   |                   |                        |   |   |
|                                 | ハモグリバエ類<br>コナジラミ類<br>アザミウマ類                                  | 1~2g/株                       | 定植時                                       |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類   | 1g/株                         | 生育期 但し、<br>収穫前日まで                         | 2回以内              | 株元散布                   |   |   |
|                                 |  | コナジラミ類                       |   |                   |                        |   |   |
| ピーマン                            | アブラムシ類<br>コナジラミ類   | 1g/株                         | 育苗期                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 |   |   |
|                                 | アザミウマ類   | 1~2g/株                       | 定植時                                       |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類   | 1g/株                         | 生育期 但し、<br>収穫前日まで                         |                   |                        |   |   |
| キャベツ                            | ハイマダラノメイガ  | 3g/株                         | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和<br>株元散布         | 3回以内<br>(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)                               |   |
|                                 | アブラムシ類   | 2g/株                         | 育苗期                                       |                   |                        |   |   |
| はくさい                            | アオムシ<br>コナガ  | 2~3g/株                       | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 | 3回以内<br>(但し、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)  |   |
|                                 | アブラムシ類   | 2g/株                         |   |                   |                        |   |   |
| アブラムシ類                          | 2g/株   | ハイマダラノメイガ                    | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 | 3回以内<br>(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)  |   |
| アブラムシ類                          | 2g/株   |                              |   |                   |                        |   |   |
| ブロccoli                         | アブラムシ類<br>コナガ  | 2g/株                         | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 | 3回以内<br>(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)  |   |
| レタス<br>非結球レタス                   | ナモグリバエ   | 培土1L当り15g                    | は種前                                       | 1回                | 培土混和<br>株元散布           | 4回以内<br>(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)                     |   |
|                                 | 1g/株   | 育苗期後半                        |   |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類<br>ナモグリバエ   | 2g/株                         | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 | 3回以内<br>(は種時の土壌混和及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)           |   |
| ねぎ                              | アザミウマ類<br>ハモグリバエ類  | 6kg/10a                      | は種時                                       | 2回以内              | 株元散布                   | 4回以内<br>(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |   |
|                                 | アザミウマ類<br>クロバネキノコバエ類   |                              | 生育期 但し、<br>収穫3日前まで                        |                   |                        |   |   |
|                                 | ハモグリバエ類  | 6~9kg/10a                    | 定植時                                       |                   |                        |   |   |
| わけぎ                             | アザミウマ類<br>ハモグリバエ類  | 6kg/10a                      | 生育期 但し、<br>収穫21日前まで                       | 1回                | 株元散布                   | 4回以内<br>(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布は2回以内)   |   |
| にんじん                            | ハモグリバエ類  | 9kg/10a                      | は種時                                       | 1回                | 播溝土壌混和                 | 4回以内<br>(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内、散布は2回以内)   |   |
|                                 |  | 6kg/10a                      |   |                   |                        |   |   |
| だいこん                            | キスジノミハムシ   | 4~6kg/10a                    | 生育期 但し、<br>収穫30日前まで                       | 1回                | 全面土壌混和<br>散布           | 5回以内<br>(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)       |   |
|                                 |  | 9~12kg/10a                   |   |                   |                        |   |   |
|                                 |  | タネバエ                         |   |                   |                        |   |   |
| チンゲンサイ                          | キスジノミハムシ   | 6kg/10a                      | 定植時                                       | 1回                | 土壌混和                   | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)  |   |
| アブラムシ類<br>キスジノミハムシ              | は種時  |                              |   |                   |                        |   |   |
| 非結球あぶらな科<br>葉菜類(チンゲンサイ除く)<br>かぶ | アブラムシ類<br>キスジノミハムシ   | 6kg/10a                      | は種時                                       | 1回                | 播溝土壌混和                 | 3回以内<br>(は種時土壌混和は1回以内、散布は2回以内)  |   |
| なばな類                            | アブラムシ類   |                              |   |                   |                        |   |   |
| ほうれんそう                          |  |                              |   |                   |                        |   |   |
| セルリー                            | ワタアブラムシ  | 2g/株                         | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)   |   |
| いちご                             |  | 0.5~1g/株                     |   |                   |                        |   |   |
| くわい                             | アブラムシ類   | 3kg/10a                      | 収穫30日前まで                                  | 3回以内              | 散布                     | 3回以内  |   |
| らっきょう                           | アザミウマ類   | 6kg/10a                      | 生育期 但し、<br>収穫前日まで                         |                   |                        |   |   |
| オクラ                             | アブラムシ類   | 9kg/10a                      | 生育期 但し、<br>収穫開始14日前まで                     | 1回                | 株元散布                   | 3回以内(株元散布1回以内、散布は2回以内)  |   |
| しょうが                            | クロバネキノコバエ類   |                              | 生育期 但し、<br>収穫14日前まで                       |                   |                        |   |   |
| さやえんどう<br>実えんどう                 | ハモグリバエ類  |                              | 生育期 但し、<br>収穫開始14日前まで                     |                   |                        |   |   |
| さやいんげん                          | アブラムシ類   |                              |   |                   |                        |   |   |
| だいず<br>えだまめ                     | フタスジヒメハムシ  | 6kg/10a                      | は種時                                       | 1回                | 播溝土壌混和                 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)  |   |
| しそ                              | マデイラコナカイガラ<br>ラムシ  | 2g/株(但し、<br>10a当り25kg<br>まで) | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)   |   |
|                                 | アブラムシ類   | 1g/株(但し<br>10a当り30kg<br>まで)  |   |                   |                        |   |   |
| 食用ぎく                            | マメハモグリバエ   | 2g/株(但し<br>10a当り30kg<br>まで)  | は種時                                       | 1回                | 播溝土壌混和<br>植溝土壌混和       | 3回以内<br>(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)  |   |
|                                 | ハモグリバエ類  | 9kg/10a                      |   |                   |                        |   |   |
| しゅんぎく                           | ハモグリバエ類  | 9kg/10a                      | 定植時                                       | 1回                | 土壌表面散布                 | 3回以内<br>(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)   |   |
|                                 |  |                              | は種時                                       |                   |                        |   |   |
| ふき                              | アブラムシ類   | 20kg/10a                     | 定植後~生育期<br>(草丈20cm頃まで)<br>但し、収穫45日<br>前まで | 1回                | 全面土壌混和                 | 2回以内<br>(は種時の全面土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内)   |   |
|                                 |  | 6kg/10a                      | は種時                                       |                   |                        |   |   |
| 茶                               | クワシロカイガラムシ   | 12kg/10a                     | 生育期 但し、<br>収穫45日前まで                       | 2回以内              | 株元散布                   | 5回以内<br>(粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水剤は合計3回以内)   |   |
|                                 |  |                              |   |                   |                        |   | 摘採7日前まで   |
| さとうきび                           | カンシャコバナナガカメムシ  | 6~9kg/10a                    | 生育期 但し、<br>収穫45日前まで                       | 2回以内              | 散布                     | 5回以内<br>(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)   |   |
|                                 | メイチュウ類   |                              |   |                   |                        |   |   |
| かんきつ(苗木)                        | ミカンハモグリガ   | 20g/株                        | 育苗期                                       | 5回以内              | 株元散布                   | 5回以内  |   |
| なし(苗木)                          | アブラムシ類   | 20g/株(但し10a当り110kgまで)        | 定植時                                       | 1回                | 株元散布                   | 1回  |   |
| きく<br>ガーベラ                      | マメハモグリバエ   | 2g/株(但し10a当り30kgまで)          | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 | 5回以内<br>(土壌混和は1回以内)   |   |
|                                 | コナジラミ類   | 1g/株(但し10a当り30kgまで)          |   |                   |                        |   |   |
|                                 | アブラムシ類   | 20kg/10a                     |   |                   |                        |   |   |
| 花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く)            | コナジラミ類   | 1g/株(但し10a当り30kgまで)          | 生育期                                       | 5回以内              | 株元散布                   | 5回以内  |   |
|                                 | アブラムシ類   | 20kg/10a                     | 定植時                                       | 1回                | 植穴土壌混和                 | 5回以内  |   |
| つつじ類                            | ツツジグンバイ  | 6kg/10a                      | 発生初期                                      | 5回以内              | 株元散布                   | 5回以内  |   |
| いぐさ                             | イグサシムシガ  | 3~6kg/10a                    | 発生初期                                      | 2回以内              | 散布                     | 2回以内  |   |