

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	DMTPを含む 農薬の 総使用回数			
みかん	サンホーゼカイガラムシ幼虫 ヤノネカイガラムシ (幼虫～未成熟成虫)	1500～2000	200～700L /10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内 (50～100倍希釈 散布は2回以内)			
	ゴマダラカミキリ成虫	1000～2000								
	カイガラムシ類 アカマルカイガラムシ幼虫 ルビーロウムシ幼虫 ツノロウムシ幼虫 チャノキイロアザミウマ ユキヤナギアブラムシ ミカンコナジラミ フラーバラゾウムシ	1000～1500								
	ミカンキジラミ ミカンバエ成虫	1500								
かんきつ (みかんを除く)	サンホーゼカイガラムシ幼虫 ヤノネカイガラムシ (幼虫～未成熟成虫) ゴマダラカミキリ成虫	1500～2000		収穫90日前まで	4回以内					
	ルビーロウムシ幼虫 チャノキイロアザミウマ ミカンコナジラミ アカマルカイガラムシ幼虫 ツノロウムシ幼虫 カイガラムシ類 ユキヤナギアブラムシ ミカンバエ成虫 ミカンキジラミ フラーバラゾウムシ	1500								
	小粒核果類	カイガラムシ類					1500	収穫14日前まで	2回以内	2回以内
	おうとう	オウトウショウジョウバエ						収穫7日前まで	3回以内	3回以内
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	収穫45日前まで		2回以内	2回以内					
くり	カツラマルカイガラムシ	1000～2000					収穫前日まで			
びわ	ビワキジラミ	1000					開花期まで			
パイナップル	パイナップルコナカイガラムシ	1000～1500		収穫21日前まで	3回以内		3回以内			
にら	ネダニ類	2000	3L/㎡	収穫30日前まで	1回	株元灌注	1回			
らっきょう			—	収穫14日前まで		30分間 種球浸漬				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ コカクモンハマキ	1000	200～400L /10a	摘採14日前まで		6回以内		散布	6回以内	
	チャノホソガ コミカンアブラムシ	1000～1500			1000L/10a					
	カイガラムシ類									
花き類・ 観葉植物(プリム ラ、シクラメン、す いせん、チュー リップ、ゆりを除 く)	オンシツコナジラミ	1000	100～300L /10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内			
シクラメン プリムラ	キンケクチブトゾウムシ成虫 オンシツコナジラミ									
すいせん	ネダニ類 オンシツコナジラミ		1000	—				植付前	30分間 球根浸漬	
	キュウコンコナカガラムシ									
チューリップ	オンシツコナジラミ	1000	100～300L /10a	発生初期	1回	散布	6回以内 株元灌注は 1回以内			
	ネダニ類	2000	3L/㎡			株元灌注				
ゆり	オンシツコナジラミ	1000	100～300L /10a		植付前	1回	散布	6回以内 球根浸漬は 1回以内		
	ネダニ類	2000	—	30分間 球根浸漬						
樹木類	カイガラムシ類幼虫	1000～1500	200～700L /10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内			
	ケムシ類	1000								
いぬまき	キオビエダシャク	1500～2000								
庭木	フラーバラゾウムシ	1000			6回以内		6回以内			
イチイ	キンケクチブトゾウムシ成虫									
げっきつ	ミカンキジラミ	1500								