

作物名	適用害虫	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	本剤及び クロルピリホス を含む農薬の 総使用回数	
てんさい	ヨトウムシ カメノコハムシ アブラムシ類	1500	100～300	収穫45日 前まで	2回以内	散布	2回以内	
ばれいしょ	アブラムシ類			収穫7日 前まで				
だいず	ハスモンヨトウ マメシンクイガ				3回以内			
あずき	アズキノメイガ アブラムシ類							
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ	1000～ 1500	200～ 400	摘採14日 前まで	2回以内		2回以内	
	クワシロカイガラムシ	1000	1000					
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～ 1500	100～ 300	収穫21日 前まで	2回以内			
	ネギハモグリバエ	1000						
かんきつ (みかんを除く)	ハマキムシ類 アブラムシ類	1500	200～ 700	収穫60日 前まで	1回		1回	
	ヤノネカイガラムシ 若令幼虫 コナカイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ幼虫	1000						
みかん (露地栽培)	ハマキムシ類 アブラムシ類	1500		200～ 700	収穫30日 前まで		2回以内	2回以内
	ヤノネカイガラムシ 若令幼虫 コナカイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ幼虫	1000						
	カミキリムシ類幼虫	20～ 70	樹幹散布					