

ダイアジンン粒剤5							
作物名	適用病害虫名	使用量 kg/10a	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジンンを含む農薬の総使用回数	
ブルーベリー		6	収穫14日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内	
かんしょ	コガネムシ類幼虫	4~6	収穫30日前まで	3回以内	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して 軽く覆土	3回以内 (マイクロカプセル剤の 植付前の処理は1回以内、 マイクロカプセル剤の 散布は2回以内、 粒剤の散布は2回以内)	
	ケラ類 ネキリムシ類		植付前	1回	全面土壌混和又は 作条土壌混和	3回以内 (植付前の土壌混和は 1回以内)	
ばれいしょ			は種時又は定植時	2回以内			
キャベツ	タネバエ	6	定植時	1回	全面土壌混和	2回以内	
	ネキリムシ類				土壌表面散布		
ブロッコリー カリフラワー	コガネムシ類幼虫	4~6	収穫30日前まで	2回以内	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して 軽く覆土	2回以内 (粒剤の生育期の処理は 1回以内)	
	ケラ		は種時又は定植時		全面土壌混和 又は作条土壌混和		
	ネキリムシ類		定植時		1回		土壌表面散布
レタス		4~6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和 又は作条土壌混和	2回以内	
非結球レタス	ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫	6					
はくさい	ネキリムシ類	6	定植時	1回	土壌表面散布	1回	
トマト ピーマン	ケラ		は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和 又は作条土壌混和	3回以内 (生育期は2回以内)	
	コガネムシ類幼虫		収穫開始10日前まで		3回以内		作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して 軽く覆土
ミニトマト	ケラ	4~6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和 又は作条土壌混和	3回以内 (生育期は2回以内)	
	ネキリムシ類		収穫前日まで		3回以内		作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して 軽く覆土
なす	コガネムシ類幼虫	4~6	収穫開始3日前まで	3回以内	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して 軽く覆土	3回以内 (粒剤の生育期の 処理は2回以内)	
	ケラ ネキリムシ類		は種時又は定植時		2回以内		全面土壌混和 又は作条土壌混和
とうがらし類			収穫開始14日前まで	3回以内	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 粒剤は3回以内)	
豆類 (種実、ただし、 だいず、あずき、 いんげんまめ、 らっかせいを除く)	コガネムシ類幼虫	4	は種時		1回		作条土壌混和
だいず えだまめ	コガネムシ類幼虫 タネバエ	4~6	収穫30日前まで	5回以内	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して 軽く覆土	6回以内 (種子粉衣は1回以内、 粒剤は5回以内 (生育期の処理は4回以内))	
	マメシキイガ カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ				4回以内		散布
	フタスジヒメハムシ ネキリムシ類				6		5回以内
あずき	タネバエ	4	は種時	1回	作条土壌混和	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種時の処理は1回以内、 生育期の処理は3回以内)	
いんげんまめ	コガネムシ類幼虫	4~6	収穫60日前まで	4回以内	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して 軽く覆土	3回以内 (種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内)	
	タネバエ	4	は種時	1回	作条土壌混和		
らっかせい	コガネムシ類幼虫	4	は種前	1回	全面土壌混和又は 作条土壌混和	1回	
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、 さやえんどう、 実えんどうを除く)	タネバエ	4~6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和 又は作条土壌混和	3回以内 (種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内)	
	コガネムシ類幼虫				は種時又は定植時		2回以内
さやえんどう 実えんどう	タネバエ	4	は種時	1回	作条土壌混和	6回以内 (種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内、 乳剤は3回以内)	
	コガネムシ類幼虫	4~6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和 又は作条土壌混和		
ねぎ わけぎ あさつき			は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和 又は作条土壌混和	2回以内	
たまねぎ	コガネムシ類幼虫	4~6	収穫30日前まで		作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して軽く覆 土		
	タネバエ タマネギバエ	6			土壌表面散布		
	ケラ コオロギ	3~5	は種時又は定植時	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して軽く覆 土			
葉たまねぎ	コガネムシ類幼虫	4~6	は種時	1回	全面土壌混和	2回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、 定植時の土壌混和は 1回以内)	
	タマネギバエ ケラ コオロギ	3~5	定植時				
	コガネムシ類幼虫	4~6					
らっきょう	ネダニ類		収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ほうれんそう	タネバエ	6	は種時	1回	作条土壌混和 又は土壌表面散布	2回以内 (は種時及びは種前 の土壌混和は 合計1回以内)	
	ヒメクロユスリカ		は種前		土壌混和		
すいか メロン	コガネムシ類幼虫	4~6	収穫14日前まで	4回以内	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して 軽く覆土	4回以内 (粒剤の生育期の処理は 3回以内)	
	ケラ ネキリムシ類						
にがうり	コガネムシ類 タネバエ ネキリムシ類	6	は種時又は定植時	2回以内	全面土壌混和 又は作条土壌混和	2回以内	
きゅうり	ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫 タネバエ	4~6	収穫21日前まで	4回以内	作付前: 全面土壌混和 又は作条土壌混和 作物生育中: 作条処理して軽く覆 土	4回以内 (粒剤の生育期の 処理は 3回以内)	
かぼちゃ	ケラ ネキリムシ類						
かぶ	キスジノミハムシ	6	収穫45日前まで	2回以内	は種時: 作条散布 作物生育中:株元散 布	2回以内 (は種前及び は種時は合計1回以内、 生育期は1回以内)	
	ネキリムシ類		出芽時		土壌表面散布		
だいこん はつくだいこん	コガネムシ類幼虫 ケラ タネバエ	4~6	は種時	1回	全面土壌混和 又は作条土壌混和	2回以内 (生育期は 1回以内)	
	ネキリムシ類		生育期 但し、収穫21日前まで		土壌表面散布		
	キスジノミハムシ	6	は種時 及び生育期 但し、 収穫21日前まで	2回以内	は種時: 作条土壌混和 作物生育中: 株元土壌混和		
にんじん	ネキリムシ類		は種前	1回	全面土壌混和	2回以内 (は種前及び は種時は合計1回以内、 生育期は1回以内)	
未成熟とうもろこし	アワノメイガ	4~6	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ヤングコーン	ネキリムシ類	6	出芽時	1回	土壌表面散布	1回	
とうもろこし(子実)	アワノメイガ		収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内	
いちご	コガネムシ類幼虫	4~6	植付時(仮植床) 定植時(本圃)		土壌混和		
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつな、みずな、 ケール、 ひろしまを除く)	ケラ キスジノミハムシ		は種時	1回	全面土壌混和	1回	
	ネキリムシ類		は種時 又は定植時		全面土壌混和		
こまつな	ケラ キスジノミハムシ		は種時	1回	全面土壌混和	1回	
	ネキリムシ類		は種時 又は定植時		全面土壌混和		
みずな	ケラ	6	は種時	1回	土壌表面散布	1回	
	ネキリムシ類 キスジノミハムシ		は種時 又は定植時		全面土壌混和		
ひろしまな	ケラ キスジノミハムシ		は種時	1回	全面土壌混和	1回	
	ネキリムシ類		は種時又は定植時		全面土壌混和		
なばな	ダイコンハムシ		定植時	1回	全面土壌混和	1回	
	ネキリムシ類		は種時		全面土壌混和		
なばな類 (はなっこりー、 なばなを除く)	ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫		は種時				
はなっこりー	ネキリムシ類	4	定植時		作条土壌混和		
畑わさび	ワサビクダアザミウマ ワサビリリソサルゾウ ムシ	3	収穫75日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ふき			収穫30日前まで	3回以内		3回以内	
ふき(ふきのとう)	フキアブラムシ	4	萌芽前、 但し収穫150日前まで	2回以内	株元散布	2回以内	
食用ゆり	クロバネキノコバエ類	6	植付時	1回	作条土壌混和	2回以内 (植付時は1回以内、 植付後は1回以内)	
			植付後、収穫30日前 まで		株元土壌混和		
たらのき			種根定植後~萌芽前		土壌表面散布	2回以内 (萌芽前は1回以内、 萌芽後は1回以内)	
にら		5	定植時		作条土壌混和	1回	
もりあざみ		6	は種時		土壌表面散布	2回以内	
オクラ	ネキリムシ類		収穫開始30日前まで	2回以内	土壌表面散布	2回以内	
葉にんにく		9	植付前				
ははこぐさ			は種時又は定植時				
なずな はこべ こおりにたびらこ		6	は種時	1回	全面土壌混和	1回	
ごま			は種前	1回			
ごぼう		4	は種時				
みつば	タネバエ		は種前				
モロヘイヤ	ネキリムシ類		定植時		土壌表面散布		
さとうきび	ハリガネムシ類		出芽時		土壌混和		
飼料用とうもろこし (子実)	ネキリムシ類		出芽時		土壌表面散布	2回以内	
飼料用とうもろこし (青刈り)	タマナヤガ	6	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内	
桑	ハリガネムシ類		定植時		植溝土壌混和	1回	
ゆり	クロバネキノコバエ類		植付時	1回	作条土壌混和	2回以内 (植付時は1回以内、 植付後は1回以内)	
			植付後		株元土壌混和		
芝	シバントガ オシジキヨトウシ シバオサゾウムシ成虫	6~9	発生初期	4回以内	散布	4回以内	
	コガネムシ類幼虫	9					