

ダントツ水溶剤								
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアジンを 含む農薬の総 使用回数	
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イネドロオイムシ イネアザミウマ	4000倍	60～150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(直播での処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	
	ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ	1000倍	25L/10a					
稲(箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ	200倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500ml	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	4回以内(移植までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	
		高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り2.5～5g(希釈倍数100～200倍))						200～400倍
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り1.25～5g(希釈倍数100～400倍))						
りんご	カメムシ類 キンモンホリガ ギンモンハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 リンゴワタムシ ケムシ類 コガネムシ類成虫	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
なし	シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 チュウゴクナシキジラミ							
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内		
ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類		2000～4000倍				収穫3日前まで	
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類	2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
うめ	ケシキスイ類 クビアカツヤカミキリ		2000～4000倍				収穫前日まで	
すもも	カメムシ類 アブラムシ類	2000倍	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
あんず	クビアカツヤカミキリ							
ぶどう	アブラムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類 アオハハゴロモ	2000～4000倍	4～8L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	6回以内(樹幹散布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)	
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 ケシキスイ類 コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ ミカンバエ ミカンキジラミ コナジラミ類							24倍
かんきつ(苗木)	カナタタキ	2000倍	200～700L/10a	収穫150日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	
	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ	24倍	4～8L/10a					
	ミカンキジラミ	48倍	4～16L/10a					
	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ アゲハ類	20倍	100ml/樹					
かき	カキノヒメコバイ アザミウマ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類	2000～4000倍	10～100ml/樹	春芽・夏芽又は秋芽の発生前	3回以内	樹幹散布	3回以内	
いちじく	アザミウマ類 カミキリムシ類			2000倍				
びわ	アブラムシ類 カメムシ類 カイガラムシ類 カミキリムシ類	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
なつめ	ゴマダラカミキリ		4000倍					
さんしょう(果実)	アザミウマ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ エアカスカシノメイガ							
オリーブ(葉)	アブラムシ類 カメムシ類	2000倍	収穫120日前まで	3回以内	散布	3回以内		
マンゴー	アザミウマ類 コナカイガラムシ類	2000～4000倍	収穫7日前まで					
パパイヤ	ナガカタカイガラムシ ヒラタカタカイガラムシ	2000倍	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
ブルーベリー	アブラムシ類 ケムシ類 オウトウショウジョウバエ		2000～4000倍				収穫45日前まで	
キウイフルーツ	キウイヒメコバイ カメムシ類 アオハハゴロモ	2000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
ハイナツプル(苗木)	ハイナツプルコナカイガラムシ							
未成熟とうもろこし	アブラムシ類 アサシカスミカメ ツマジロクサヨトウ	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類							
メロン	アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ ウリハムシ ハモグリバエ類	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
すいか	アブラムシ類 ウリハムシ ミナミキイロアザミウマ		2000倍					
にがうり	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
かぼちゃ	アブラムシ類 ウリハムシ カボチャミバエ							
とうがん	ミナミキイロアザミウマ	2000倍	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内		
食用へちま	アブラムシ類							
なす	ミナミキイロアザミウマ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 テントウムシダマシ カメムシ類	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内		
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類							
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類 ミナミキイロアザミウマ	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
とうがらし類	アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ							
キャベツ	アブラムシ類 アザミウマ類 アオムシ コナガ	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
はくさい	アブラムシ類 アオムシ コナガ							
ブロッコリー	アブラムシ類 アオムシ コナガ	2000倍	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内		
はなっこり	アブラムシ類							
だいこん	アブラムシ類 ダイコンハムシ	2000～4000倍	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内		
かぶ	アブラムシ類							
非結球あぶらな科 葉菜類(にまつな、 チンゲンサイ、なば な類、みずなを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内		
こまつな	アブラムシ類							
チンゲンサイ	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内		
みずな	アブラムシ類							
しゅんぎく	アブラムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内		
レタス	アブラムシ類 アザミウマ類 ナモグリバエ							
非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000～4000倍	収穫前日まで	4回以内	散布	3回以内		
ねぎ	アブラムシ類							
わげき あざつき	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	2000～4000倍	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
にら	アブラムシ類 ネギアザミウマ ネギネクロバネキノコバエ							
にら(花茎)	アブラムシ類 ネギアザミウマ	2000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ類	1000倍	25L/10a					
かんしょ	アブラムシ類	2000～4000倍	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内		
やまのいも	アブラムシ類							
てんさい	テンサイトビハムシ カメコハムシ テンサイモグリハナバエ アブラムシ類	100～200倍	1L/ペーパースト1冊(3L/m)	定植前	3回以内	灌注	4回以内(定植前の灌注は1回以内、散布は3回以内)	
	アブラムシ類							
豆類(未成熟、ただし、 えだまめを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
あずき	アブラムシ類 マメホソクチゾウムシ							
いんげんまめ	アブラムシ類 カメムシ類 インゲンマメゾウムシ	2000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
だいず	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ							
豆類(未成熟、ただし、 えだまめを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	
えだまめ	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ マメシンクイガ							
オクラ	アブラムシ類 カメムシ類	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
ほうれんそう	アブラムシ類							
みつば	アブラムシ類	2000～4000倍	収穫3日前まで	1回	散布	3回以内		
パセリ	アブラムシ類							
せり	アブラムシ類	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内		
セルリー	アブラムシ類 ネギアザミウマ							
アスパラガス	アブラムシ類 ネギアザミウマ ジュウシホシクビナガハムシ カメムシ類	2000～4000倍	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
みょうが(花種)	アブラムシ類							
みょうが(莖菜)	アブラムシ類 ナスコナカイガラムシ	2000倍	みょうが(花種)の収穫前日まで 但し、花種を収穫しない場合は開花期終了まで	3回以内	散布	3回以内		
れんこん	クワイビレアブラムシ							
くわい	アブラムシ類	2000倍	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内		
茶	チャトゲコナジラミ マダラカサハラムシ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバイ チャノホソガ ツマグロアオカスミカメ コミカンアブラムシ							
きく	ナモグリバエ アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 カメムシ類	2000～4000倍	1L/m ²	発生初期	4回以内	生育期株元灌注	4回以内	
ばら	アブラムシ類 コガネムシ類		2000倍					1L/m ²
花き類・観葉植物	アブラムシ類 アザミウマ類	2000～4000倍	100～300L/10a	摘採7日前まで	5回以内	散布	4回以内	
デイゴ	アブラムシ類							
げっしつ	アブラムシ類	2000倍	200～700L/10a	発生初期	6回以内	樹幹散布	5回以内	
さくら	アブラムシ類							
つつじ類	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	成虫発生初期	6回以内	散布	6回以内	
たであい	アブラムシ類							
わた	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内	