

ダントツ粒剤

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	
	カメムシ類	3～4kg/10a					
稲(箱育苗)	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ イネヒメハモグリバエ	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の苗の上から均一に散布する	4回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	
		高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)					
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ	1～2g/株	育苗期後半	3回以内	株元処理	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は3回以内)	
	コナジラミ類 アブラムシ類		定植時		植穴処理 土壌混和		
	ミナミキイロアザミウマ	2g/株					
メロン	アブラムシ類	1～2g/株	定植後但し、 収穫前日まで	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は3回以内)	
	コナジラミ類		育苗期後半		株元処理		
	アブラムシ類	定植時	1回	植穴処理 土壌混和			
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ				2g/株		
	アブラムシ類		定植後但し、 収穫前日まで	3回以内	株元散布		
すいか	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1～2g/株	定植時	1回	植穴処理 土壌混和	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	
かぼちゃ にがうり	アブラムシ類					1回	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
うり類(漬物用、ただし、とうがん、食用へちまを除く)							
とうがんで 食用へちま							
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期	1回	株元処理	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は3回以内)	
	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	定植時	植穴処理 土壌混和				
	アブラムシ類	1～2g/株	定植後但し、 収穫前日まで	3回以内	株元散布		
なす	コナジラミ類		育苗期後半	1回	株元処理		
	アブラムシ類 コナジラミ類 マメハモグリバエ	定植時	植穴処理 土壌混和				
	1～2g/株	定植後但し、 収穫前日まで	3回以内	株元散布			
ピーマン	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	株元処理	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	
		定植時	植穴処理 土壌混和				
		1～2g/株	定植後但し、 収穫前日まで	2回以内	株元散布		
キャベツ	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	0.25g/株	は種時	1回	覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する	3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)	
	アブラムシ類 ネギアザミウマ	3～6kg/10a			播溝処理 土壌混和		
		6kg/10a			地床育苗期		株元散布
	コナガ、アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌1.5～4L)当たり50g	育苗期後半		セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する		
	コナガ、アオムシ アブラムシ類 ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類	0.5g/株			株元処理		
	コナガ アオムシ	2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和		
	1～2g/株						
はくさい	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	0.25g/株	は種時	覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する	5回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内)		
	アブラムシ類 アオムシ、コナガ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類	0.5g/株	育苗期後半	株元処理			
	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	1～2g/株	定植時	植穴処理 土壌混和			
	コナガ、アオムシ	2g/株					
ブロッコリー	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	0.25g/株	は種時	1回	セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に混和する	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	
	コナガ、アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ						