

バイデートL粒剤

作物名	適用害虫名	使用薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサミルを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	ジャガイモシストセンチュウ ジャガイモシロシストセンチュウ	30kg/10a	植付前	1回	全面土壌混和	1回	
	ネグサレセンチュウ	20kg/10a			植溝処理土壌混和		
	アブラムシ類						
ピーマン	アブラムシ類	1.5～2.5g/株	株元灌注		株元処理	2回以内 （育苗期の株元処理は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内は）	
	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株			全面土壌混和		
	ネコブセンチュウ	50kg/10a	定植前				
メロン（地床）	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株	育苗期		株元処理		
メロン（揚床）		1g/株					
メロン	ネコブセンチュウ	40～50kg/10a	定植前		全面土壌混和		
にがうり		40kg/10a					
きゅうり	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～50kg/10a	は種前又は定植前			株元処理	
	アブラムシ類		定植前				
	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株	育苗期				
すいか	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	25～35kg/10a	は種前又は定植前				全面土壌混和
	ミナミキイロアザミウマ	1～2.5g/株	育苗期		株元処理		
	アブラムシ類	1.5～2.5g/株					
レタス	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	40～50kg/10a	定植前		全面土壌混和		
リーフレタス		40kg/10a	定植前但し、 収穫75日前まで				
トマト ミニトマト		25～50kg/10a	定植前				
だいこん	ネコブセンチュウ アブラムシ類	25～50kg/10a	は種前			全面土壌混和	
	ネグサレセンチュウ	20～50kg/10a					
にんじん	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						20～37g/10a
ごぼう							
もりあざみ	キタネグサレセンチュウ	40～50kg/10a	植付前 （挿苗前）		全面土壌混和		
かんしょ	ネコブセンチュウ	30～40kg/10a		作条土壌混和			
		40～50kg/10a		全面土壌混和			
やまのいも							
	ダイズシストセンチュウ	6kg/10a	は種前又は定植前	作条土壌混和			
30kg/10a		は種前	全面土壌混和				
6kg/10a			作条土壌混和				
30kg/10a			全面土壌混和				
6kg/10a			作条土壌混和				
えだまめ		30kg/10a	は種前又は定植前	全面土壌混和			
にんにく	イモグサレセンチュウ	30～50kg/10a	植付前	作条土壌混和			
たばこ	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	37kg/10a	定植前	作条土壌混和			