

ハチハチ乳剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	トルフェンピラド を含む農薬の 総使用回数				
キャベツ	アザミウマ類	1000	100～300	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内				
	はくさい	ハイマダラノメイガ コナガ アオムシ アブラムシ類						1000～2000			
レタス	ナメクジ類	1000									
	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000～2000									
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ カブラハバチ ダイコンハムシ 白さび病 ワッカ症	2000						収穫30日前 まで	1回	1回	
	かぶ	キスジノミハムシ コナガ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ アブラムシ類						収穫7日前ま で			
きゅうり	うどんこ病 べと病 褐斑病	1000						収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	ウリノメイガ アブラムシ類 コナジラミ類	1000～2000									
にがうり	アザミウマ類	1000									
すいか	うどんこ病 コナジラミ類	1000									
	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～2000									
ばれいしょ	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000									
ねぎ	アザミウマ類 アブラムシ類 ネギハモグリバエ クロバネキノコバエ ネギコガ シロイチモジヨトウ さび病 べと病	1000	収穫7日前ま で								
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 コナガ	1000～2000									
ピーマン	アザミウマ類		収穫前日まで	1回	1回						
	コナジラミ類 チャノホコリダニ うどんこ病										
にんにく	ネギコガ チューリップサビダニ アザミウマ類 アブラムシ類 さび病	1000	収穫7日前ま で	2回以内	2回以内						
やまのいも	アブラムシ類 ナガイモガ 葉渋病		収穫前日まで								
たまねぎ	べと病										
らっきょう	アザミウマ類										
にら	ネギアザミウマ		収穫14日前 まで								
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～1500	200～400	摘採14日前 まで	1回	1回					
	マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ ツマグロアオカスミカメ										
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000	100～300	発生初期	4回以内	4回以内					
	白さび病			発病初期							
しきみ	アザミウマ類		100～700	発生初期							