

バリアード顆粒水和剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	散布量 (L/10a)	使用時期	使用回数 *	使用方法
りんご	カメムシ類 リンゴワタムシ	2000	200～700	収穫前日まで	3回以内	散布
	アブラムシ類	4000				
	シンクイムシ類	2000～4000				
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類	4000				
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000～4000				
	クワコナカイガラムシ	4000				
	カメムシ類	2000				
もも	シンクイムシ類 アブラムシ類 モモハモグリガ	2000～4000		収穫3日前まで	2回以内	
ネクタリン						
小粒核果類 (うめ、すももを除く)						
すもも	アブラムシ類	4000		収穫前日まで	2回以内	
	シンクイムシ類					
	モモノゴマダラノメイガ					
おうとう	アブラムシ類	2000～4000				
	オウトウショウジョウバエ	2000				
かき	ウメシロカイガラムシ	4000				
	カキノヘタムシガ コナカイガラムシ類 アザミウマ類	2000				
うめ	アブラムシ類	2000～4000	収穫21日前まで	2回以内		
	アカマダラケシキスイ シンクイムシ類	4000				
ぶどう	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	4000				
メロン	ウリノメイガ	2000	100～300	収穫前日まで	3回以内	
	アブラムシ類	4000				
	いちご	ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類				2000～4000
アブラムシ類						
すいか ピーマン	アブラムシ類	2000～4000				
	コナジラミ類	2000				
とうがらし類	アブラムシ類	4000				
なす トマト	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～4000				
	アブラムシ類	4000				
きゅうり	アブラムシ類	2000～4000				
	ウリノメイガ	2000				
ばれいしょ	アブラムシ類	4000				収穫7日前まで
ズッキーニ				収穫前日まで		
こまつな				収穫21日前まで		
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ コミカンアブラムシ	2000～4000		200～400	摘採7日前まで	1回
	マダラカサハラハムシ	2000				