

モスピラン粒剤

作物名	適用害虫名	* 使用量	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数
ぶどう	ブドウネアブラムシ	30g/㎡(但し6kg/10a以下)	収穫14日前まで	樹冠下または主幹周辺に散布	3回以内	3回以内
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ アブラムシ類	10～20g/樹	育苗期	株元散布	1回	1回
キャベツ	コナガ アオムシ	1～2	定植時	植穴土壌混和		6回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、 散布及び定植後の株元散布は合計5回以内)
		0.5～1	定植前日～定植当日	株元散布		
	アブラムシ類					
	アブラムシ類	1	定植時	植穴土壌混和		
1～2	株元散布					
はくさい		コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	0.5	定植前日～定植当日		株元散布
	コナガ アオムシ アブラムシ類	1	定植時	植穴土壌混和		
ブロッコリー	ハイマダラノメイガ	0.5	定植前日～定植当日	株元散布		
	コナガ アオムシ アブラムシ類	0.5～1				
	アオムシ アブラムシ類	1	定植時	植穴土壌混和		
	コナガ	1～2				
カリフラワー	コナガ アオムシ	0.5～1	定植前日～定植当日	株元散布		4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、 散布は3回以内)
	アブラムシ類		定植当日			
非結球メキャベツ	ハイマダラノメイガ	1	定植日	植穴土壌混和		3回以内
チンゲンサイ	コナガ アオムシ アブラムシ類	3kg/10a	は種時	土壌混和		2回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、 散布は1回以内)
		0.5	定植前日～定植当日			
	キスジノミハムシ		定植当日			
非結球あぶらな葉菜類 (チンゲンサイを除く) だいこん	コナガ アブラムシ類	3kg/10a	は種時	播溝土壌混和		1回
きゅうり	アブラムシ類	0.5～1	定植時	株元散布		5回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、 2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、 散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内)
		0.5	定植後 但し収穫30日前まで			
すいか		1	定植時	植穴土壌混和		4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)
			は種時			
かぼちゃ		0.5	定植時	植穴土壌混和		3回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回以内)
			定植前日～定植当日			
ピーマン	コナジラミ類	0.5	定植時	植穴土壌混和		2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内)
			定植時			
とうがらし類 (ししとうを除く)	アブラムシ類	1	定植時	植穴土壌混和		3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)
ししとう	コガネムシ類幼虫					
なす	アブラムシ類	0.5	定植前日～定植当日	株元散布		4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、 散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)
		0.5～1	定植時	植穴土壌混和		
	ミナミキイロアザミウマ コガネムシ類幼虫	1				
トマト ミニトマト	コナジラミ類	1	定植前日～定植当日	株元散布		
	トマトハモグリバエ		定植時	植穴土壌混和		
	いちご	アブラムシ類	0.5	生育期 但し、 収穫前日まで		株元散布
0.5			定植時			
0.5～1			定植時	植穴土壌混和		
コナジラミ類 コガネムシ類幼虫		1	定植時	植穴土壌混和		
レタス	ナモグリバエ オオタバコガ ヨトウムシ	0.5	定植前日～定植当日	株元散布	4回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、 散布は3回以内)	
	アブラムシ類	0.25～0.5				
非結球レタス	ナモグリバエ オオタバコガ ヨトウムシ	0.5				
ばれいしょ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時	植溝土壌混和	4回以内 (植付時の土壌混和は1回以内、 植付後は3回以内)	
わけぎ あさつき	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	6kg/10a	は種時	播溝土壌混和	4回以内 (土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)	
植付時			植溝土壌混和			
ねぎ		0.25～0.5	定植前日～定植当日	株元散布		
			6kg/10a	は種時	播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、 植付時の土壌混和及び定植当日までの株元散布は合計1回以内)
植付時	植溝土壌混和					
えだまめ	アブラムシ類	3kg/10a	は種時	播溝土壌混和	4回以内 (は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、 散布は3回以内)	
		1	定植時	植穴土壌混和		
ふき	コナジラミ類 モモアカアブラムシ	2	収穫90日前まで	株元散布	3回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、 散布及びくん煙は合計2回以内)	
セルリー	ナモグリバエ	0.5	定植時	植穴土壌混和	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内)	
ひこしまはるな	アブラムシ類					
さといも						1
こんにゃく	ワタアブラムシ	3kg/10a	培土時(出芽期)	株元土壌混和	1回	
ストック	ハイマダラノメイガ	0.5	育苗期	株元散布		
きく	アブラムシ類	0.5～1	生育初期	株元散布		
	アザミウマ類					1
	ハモグリバエ類	定植時	植穴土壌混和			
	ミカンキイロアザミウマ		植溝土壌混和			
つつじ類	ツツジグンバイ	3～6kg/10a	発生初期	株元散布	5回以内 (樹幹注入は1回以内)	
たばこ	アブラムシ類	0.5～1	定植時		3回以内 (定植後は2回以内)	
		0.25	育苗期後半			

かぼちゃ			1			3回以内 （粒剤の 定植時までの処理は 1回以内、散布及び定植後の株元 散布は合計 2回以内）
				は種時	播溝土壌混和	
ピーマン		0.5	定植時	植穴土壌混和	3回以内 （粒剤の定植時 までの処理は1回以内、散布、 くん煙及び定植後の株元散布は合 計2回以内）	
			定植前日～定植当日	株元散布		
	コナジラミ類	0.5	定植時	植穴土壌混和	2回以内 （定植時の 土壌混和は1回以内）	
とうがらし類 （ししとうを除く）	アブラムシ類					
ししとう	コガネムシ類幼虫	1			3回以内 （定植時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内）	
なす	アブラムシ類	0.5	定植前日～定植当日	株元散布	3回以内	
		0.5～1				
	ミナミキイロアザミウマ コガネムシ類幼虫	1	定植時	植穴土壌混和		
トマト ミニトマト	コナジラミ類	0.5～1	定植前日～定植当日	株元散布		
		1	定植時	植穴土壌混和		
トマトハモグリバエ						
いちご	アブラムシ類	0.5	生育期 但し、 収穫前日まで	株元散布		
		0.5	定植時			
		0.5～1	生育期/定植30日後 まで/但しマルチ被覆 直前まで			
	コナジラミ類 コガネムシ類幼虫	1	定植時	植穴土壌混和		
レタス	ナモグリバエ オオタハコガ ヨトウムシ	0.5	定植前日～定植当日	株元散布	3回以内 （粒剤の株元散布及び土壌混和は 合計1回以内、 散布くん煙は合計2回以内）	
	アブラムシ類	0.25～0.5				
非結球レタス	ナモグリバエ オオタハコガ ヨトウムシ	0.5				
ばれいしょ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時	播溝土壌混和	4回以内 （植付時の土壌混和は1回以内、 植付後は3回以内）	
わけぎ あさつき	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	6kg/10a	は種時	播溝土壌混和	4回以内 （土壌混和は1回以内、 散布は3回以内）	
			植付時	播溝土壌混和		
ねぎ			0.25～0.5	定植前日～定植当日	株元散布	
			6kg/10a	は種時	播溝土壌混和	3回以内 （は種時の土壌 混和は1回以内、植付時 の土壌混和及び定植 当日までの株元散布は 合計1回以内）
			植付時	播溝土壌混和		
えだまめ	アブラムシ類	3kg/10a	は種時	播溝土壌混和	4回以内 （は種時または定植時の 土壌混和は合計1回以内、散布は 3回以内）	
		1	定植時	植穴土壌混和		
ふき	コナジラミ類 モモアカアブラムシ	2	収穫90日前まで	株元散布	3回以内 （粒剤の株元散布は1回以内、 散布及びくん煙は合計2回以内）	
セルリー	ナモグリバエ	0.5	定植時	植穴土壌混和	2回以内 （定植時の 土壌混和は1回以内）	
ひこしまはるな	アブラムシ類					
さといも		1				
こんにゃく	ワタアブラムシ	3～6kg/10a	植付時	播溝土壌混和	1回	
ストック	ハイマダラノメイガ	0.5	育苗期	株元散布		
きく	アブラムシ類	0.5～1	生育初期	株元散布	5回以内	
	アザミウマ類	1				
	ハモグリバエ類		定植時	植穴土壌混和		
	ミカンキイロアザミウマ	播溝土壌混和				
つつじ類	ツツジゲンバイ	3～6kg/10a	発生初期	株元散布	5回以内 （樹幹注入は1回以内）	
たばこ	アブラムシ類	0.5～1	定植時			
		0.25	育苗期後半		3回以内 （定植後は2回以内）	