

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	アケビコノハ ヒメエグリバ ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類 アブラムシ類 ケシクスイ類 ミカンハダニ コアオハナムグリ ミドリヒメヨコバイ シャクトリムシ類 ハマキムシ類 カネタタキ ケムシ類	2000倍	200～700L /10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内)	
もも	カメムシ類 アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ アカエグリバ アケビコノハ オオエグリバ ヒメエグリバ	1000～2000倍		収穫前日まで	5回以内		10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内)	
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	1000倍		収穫14日前まで	2回以内		7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内)	
あずき	ハダニ類	2000倍	100～300L /10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
ピーマン	アブラムシ類 ハダニ類 オンシツコナジラミ アブラムシ類 アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類 アブラムシ類			3回以内				
いちご				4回以内				
すいか メロン				5回以内				
なす				3回以内				
トマト				5回以内				
きゅうり				3回以内				
かぼちゃ				3回以内				
ししとう				2000倍		収穫3日前まで		3回以内
ししとう				2000倍		収穫前日まで		3回以内
茶	チャトゲコナジラミ	1000倍	—	挿し木前	1回	3分間挿し穂浸漬		
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ チャトゲコナジラミ	1000～2000倍	200～400L /10a	摘採7日前まで		散布	1回	
	チャハマキ ヨモギエダシャク ツマグロアオカスミカメ	1000倍						
花き類・観葉植物	アブラムシ類 ハダニ類	—	100～300L /10a	—	6回以内	6回以内		