

ロディー水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数															
かんきつ	アブラムシ類 ミノガ類	1000~2000	200~700	収穫7日前まで	4回以内	散布	9回以内 (噴射は5回以内、 散布及びくん煙は 合計4回以内)															
	チャノキイロアザミウマ	2000																				
	ハスモンヨトウ	1000																				
りんご	シンクイムシ類 キンモンホソガ アブラムシ類 ハマキムシ類 カメムシ類	1000~1500		2回以内	収穫前日まで		2回以内	7回以内 (噴射は5回以内、 散布は2回以内)														
	ナミハダニ リンゴハダニ ギンモンハモグリガ	1000																				
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類	1000~1500		1000					5回以内	2回以内	10回以内 (噴射は5回以内、 散布は5回以内)											
	カメムシ類 ハダニ類 コガネムシ類	1000																				
もも	モモハモグリガ	1000~2000		1000								2回以内	2回以内	7回以内 (噴射は5回以内、 散布2回は以内)								
	アブラムシ類 シンクイムシ類	1000																				
すもも	シンクイムシ類	2000		3回以内											3回以内	8回以内 (噴射は5回以内、 散布は3回以内)						
ぶどう	チャノキイロアザミウマ																					
かき	カキノヘタムシガ チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ カメムシ類 ハマキムシ類	1500															2000倍	2回以内	3回以内	7回以内 (噴射は5回以内、 散布は2回以内)		
	おうとう	ケムシ類																				
うめ	モモヒメヨコバイ	2000~4000	2000倍			3回以内											3回以内				8回以内 (噴射は5回以内、 散布は3回以内)	
	アブラムシ類 ノコメトガリキリガ																					
びわ	ビワキジラミ アブラムシ類 カメムシ類	2000			2000倍		4回以内	4回以内														9回以内 (噴射は5回以内、 散布及びくん煙は 合計4回以内)