カルホス微粒剤Ｆ

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用害虫名</th><th>使用量</th><th>使用時期</th><th>本剤の
使用回数</th><th>使用方法</th><th>イソキサチオン
を含む農薬の
総使用回数</th></tr>
<tr><td>りんご</td><td>モモシンクイガ</td><td>5kg/10a</td><td>夏繭営繭時～
第一世代
成虫羽化期</td><td>4回以内</td><td>地表面散布</td><td>4回以内</td></tr>
<tr><td>キャベツ
はくさい</td><td rowspan="7">ネキリムシ類</td><td rowspan="7">6kg/10a</td><td rowspan="2">は種時
又は
植付時</td><td>1回</td><td rowspan="7">土壌表面散布
土壌混和処理</td><td>1回</td></tr>
<tr><td>レタス
非結球レタス</td><td>2回以内</td><td>2回以内</td></tr>
<tr><td>だいこん</td><td>は種時～
生育初期
但し、
収穫30日前まで</td><td rowspan="4">1回</td><td>1回</td></tr>
<tr><td>エンダイブ</td><td>定植時</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ねぎ</td><td>は種時</td><td rowspan="2">4回以内
（は種時は1回以内、
植付時は1回以内、
植付後は2回以内）</td></tr>
<tr><td>植付時</td></tr>
<tr><td>わけぎ
あさつき</td><td>は種時
又は植付時</td><td>2回以内</td><td>2回以内</td></tr>
<tr><td>かんしょ</td><td>ドウガネブイブイ幼虫</td><td>9kg/10a</td><td>挿苗前</td><td>1回</td><td>挿苗前に畦内
の元肥位置に
散布し、
土壌混和処理</td><td>4回以内
（挿苗前の
土壌混和は1回以内、
散布は3回以内）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">だいず</td><td>タネバエ</td><td rowspan="5">6kg/10a</td><td>は種時</td><td></td><td rowspan="7">土壌表面散布
土壌混和処理</td><td rowspan="2">2回以内</td></tr>
<tr><td>ネキリムシ類</td><td>は種時
又は定植時</td></tr>
<tr><td rowspan="3">えだまめ</td><td>タネバエ</td><td rowspan="2">は種時</td><td rowspan="8">1回</td><td rowspan="3">5回以内
（粉剤及び粉粒剤
のは種時の処理は
合計1回以内、
粉剤及び粉粒剤
の定植時は
合計1回以内、
粉剤の土壌表面散布
は1回以内、
粒剤の土壌表面株元
処理は2回以内）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ネキリムシ類</td></tr>
<tr><td>定植時</td></tr>
<tr><td>いちご（仮植床）</td><td>コガネムシ類幼虫</td><td>9kg/10a</td><td>植付時</td><td rowspan="6">1回</td></tr>
<tr><td>食用ぎく</td><td rowspan="3">ネキリムシ類</td><td rowspan="2">6kg/10a</td><td rowspan="3">定植時</td><td rowspan="5">1回</td></tr>
<tr><td>しゅんぎく</td><td>作条処理
土壌混和</td></tr>
<tr><td>かぼちゃ
すいか</td><td>株当り3g</td><td>植穴処理
土壌混和</td></tr>
<tr><td>ほうれんそう</td><td>タネバエ</td><td rowspan="3">6kg/10a</td><td>は種時</td><td>作条処理
土壌混和</td></tr>
<tr><td>もりあざみ</td><td rowspan="2">ネキリムシ類</td><td>収穫21日前まで</td><td>土壌表面散布
土壌混和処理</td></tr>
<tr><td>ほうきぎ</td><td>定植時</td><td>株元散布</td></tr>
<tr><td>たばこ</td><td>ネキリムシ類
ハリガネムシ</td><td>6～9kg/10a</td><td>植付前</td><td>土壌表面散布
土壌混和処理</td><td>2回以内</td></tr>
<tr><td>花き類・観葉植物</td><td>カブラヤガ</td><td>6kg/10a</td><td>定植時</td><td>作条処理
土壌混和</td><td>1回</td></tr>
</table>