

アニキ乳剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	本剤及びレピ メクチンを含む 農薬の総使用 回数										
みかん	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～4000倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで		4回以内										
	ミカンハモグリガ	1000～2000倍														
	ミカンサビダニ	2000～4000倍														
	チャノホコリダニ	4000倍														
かんきつ (みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～4000倍		収穫3日前 まで												
	ミカンハモグリガ	1000～2000倍														
	ミカンサビダニ	2000～4000倍														
	チャノホコリダニ	4000倍														
だいず えだまめ	ハスモンヨトウ	2000～3000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	散布	3回以内										
さといも		2000倍														
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000～3000倍														
豆類(未成熟、ただし、え だまめ、さやえんどうを 除く)	ハスモンヨトウ	2000倍														
さやえんどう	ハモグリバエ類	1000倍														
メロン	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍				4回以内										
すいか	オオタバコガ	1000倍				3回以内										
アスパラガス	コナジラミ類															
	ハスモンヨトウ	2000倍														
いちご	オオタバコガ	1000～2000倍														
トマト ミニトマト	オオタバコガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 トマトサビダニ	2000倍														
	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	1000～2000倍														
なす	ハスモンヨトウ コナジラミ類															
	オオタバコガ ハモグリバエ類 チャノホコリダニ	2000倍														
ピーマン とうがらし類	コナジラミ類	1000～2000倍														
	ハスモンヨトウ オオタバコガ チャノホコリダニ	2000倍														
きゅうり	コナジラミ類	1000倍														
		2000倍														
ほうれんそう セルリー		ハスモンヨトウ					1000～2000倍									
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ															
非結球あぶらな科 葉菜類	コナガ ハスモンヨトウ キスジノミハムシ ハモグリバエ類															
非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ															
レタス		シロイチモジヨトウ														
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ ウワバ類															
	シロイチモジヨトウ	2000倍														
はくさい	キスジノミハムシ ダイコンハムシ	1000倍														
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ カブラハバチ類	1000～2000倍														
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ															
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ	2000倍														
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギコガ	1000～2000倍														
	ネギアザミウマ ハモグリバエ類	1000倍														
たまねぎ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000倍					収穫前日 まで									
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類	1000～2000倍					収穫3日前 まで									
かぶ	コナガ	1000倍					収穫前日 まで									
	キスジノミハムシ	2000倍														
未成熟とうもろこし	オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	1000倍														
	ハスモンヨトウ	2000倍														
ヤングコーン	オオタバコガ	1000倍														
食用金魚草 食用なでしこ 食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレニア 食用パンジー しそ科葉菜類 (しそを除く) しそ(花穂)	ハスモンヨトウ	2000倍														
しそ	ハスモンヨトウ シソサビダニ	2000倍														
食用ぎく	オオタバコガ ハスモンヨトウ															
きく(葉)	オオタバコガ ハスモンヨトウ	収穫3日前 まで														
茶	チャノコカクモンハマキ	1000～2000倍					200～ 400L/10a	摘採7日前 まで	2回以内							
きく	オオタバコガ ハスモンヨトウ		100～ 300L/10a	発生初期		6回以内										
	マメハモグリバエ	1000倍														
カーネーション	オオタバコガ	1000～2000倍														
ストック	コナガ															
りんどう	リンドウホソハマキ	2000倍														