

バイスロイド乳剤

作物名	適用害虫名	希釗倍数 (倍)	使用液量 L/10a	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	総使用回数 (*)				
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	1000~2000	100~ 300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内				
はくさい	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ	1000~2000		収穫3日前まで							
だいこん				収穫3日前まで							
ごぼう	アブラムシ類			収穫7日前まで							
にんじん	ヨトウムシ	2000		収穫21日前まで	3回以内		3回以内				
たまねぎ	ネギアザミウマ			収穫前日まで	4回以内		4回以内				
レタス	ヨトウムシ アブラムシ類			収穫7日前まで	2回以内		2回以内				
えだまめ	マメシンクイガ	1000~2000		収穫14日前まで	3回以内						
	カメムシ類	1000									
豆類 (種実、ただし、だい ず、あずき、いんげん まめを除く)	アブラムシ類	2000									
だいす	カメムシ類	1000		収穫7日前まで							
	マメシンクイガ	1000~2000									
あずき	アブラムシ類 アズキノメイガ			3回以内							
いんげんまめ	インゲンマメゾウムシ	2000									
小麦	ア布拉ムシ類	60~150									
ばれいしょ		2000~3000	100~300	収穫14日前まで	4回以内	散布	3回以内				
かんしょ	イモコガ ナカジロシタバ	1000~2000									
てんさい	ヨトウムシ	2000~3000									
	500	25									
	カメノコハムシ	2000									
	500	25									
茶	チャノコカクモンハマキ チャノキイロアザミウマ チャハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ	1000~2000	200~400	摘採7日前まで	1回		1回				