

スピラン顆粒水溶液									
作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	アセチムプリドを含む農薬の総使用回数	使用方法		
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 カイガラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 コオオハナムグリ ケンキスイ類 アゲハ類 カメムシ類 ミカンバエ	2000~4000	200~700	収穫14日前まで			散布		
	コナジラミ類	4000							
りんご	アブラムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホリコガ シンクイムシ類 カメムシ類 リンゴワタムシ	2000~4000	30~75	収穫前日まで			主幹から 株元に 散布		
	カイガラムシ類 モモチヨッキリゾウムシ コガネムシ類成虫	4000							
なし	ケムシ類 キリガ類	2000							
	カメムシ類 アブラムシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類 カキノヒメヨコバイ	2000~4000							
ぶどう	ナシホリガ	4000							
	カイガラムシ類 アザミウマ類 フタテヒメヨコバイ コガネムシ類成虫	2000~4000							
かき	ツマグロアオカスミカメ トビロトラガ	2000		収穫後秋期	3回以内	3回以内			
	アザミウマ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ カキノヒメヨコバイ カメムシ類	2000~4000							
かき(葉)	ブドウトラカミキリ								
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 アザミウマ類 カメムシ類 コガネムシ類成虫 モモチヨッキリゾウムシ	2000~4000		収穫前日まで					
	コスカシバ カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ	2000							
ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 アザミウマ類 カメムシ類 コガネムシ類成虫 モモチヨッキリゾウムシ	4000		収穫3日前まで					
小粒核果類 (うめ、ずももを除く)	カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ	2000	200~700	収穫前日まで					
	アブラムシ類	2000~4000							
うめ	ケシキスイ類 ノコギリキリガ	2000		収穫前日まで					
	クビアカツヤカミキリ カイガラムシ類	2000~6000							
ずもも	シンクイムシ類 アブラムシ類 スモモミハバチ	2000~4000		収穫前日まで					
	カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ	2000							
おうとう	カメムシ類 オウトウショウジョウバエ	2000~4000		1回	1回				
	アザミウマ類	4000							
マンゴー	カイガラムシ類	2000		収穫35日前まで					
キウイフルーツ	キウイチヨコバイ			収穫7日前まで					
びわ	アブラムシ類 カミキリムシ類	2000~4000		収穫前日まで	3回以内	3回以内			
	カイガラムシ類 ビウキジラミ	2000							
いちじく	アザミウマ類 キノシカミキリ カイガラムシ類 イチジクヒトリモドキ	2000		収穫14日前まで	2回以内	2回以内			
かりん	ナシヒメシメシクイ			収穫7日前まで	1回	1回			
あけび(果実)	アブラムシ類	4000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ			収穫30日前まで	1回	1回			
アセロラ	アブラムシ類			収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
パッションフルーツ	カイガラムシ類	2000		収穫7日前まで	1回	1回			
オリーブ	カメムシ類			収穫7日前まで	1回	1回			
くり	アブラムシ類 カイガラムシ類	4000		収穫7日前まで	3回以内	3回以内 (樹幹注入は1回以内)			
	クリシキゾウムシ クリミガ	2000~4000							
ゴレンシ	モモゴマダラノメイガ	2000		収穫21日前まで					
レイシ	カイガラムシ類	4000		収穫7日前まで		3回以内			
たらのぎ	センノカミキリ	2000		収穫45日前まで		1回			
食用さくら(葉)	アザミウマ類	4000		収穫35日前まで		1回			
とうもろこし(子実)	カイガラムシ類			収穫7日前まで					
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	2000~4000		収穫14日前まで	3回以内	3回以内			
ヤングコーン		2000		収穫前日まで	2回以内	2回以内			
キャベツ	アブラムシ類 アザミウマ類	2000~4000		収穫7日前まで	5回以内	6回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、散布及び定植後の 株元散布は5回以内)			
	コナガ アオムシ キスジノミハムシ	1000~2000							
カリフラワー	コナガ アオムシ			収穫前日まで	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回内、散布は合計3回以内)			
ブロッコリー	アブラムシ類	2000		収穫14日前まで	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回内、 散布及び定植後の株元散布は 合計3回以内)			
	コナガ アオムシ アザミウマ類	4000							
茎ブロッコリー	アブラムシ類	4000		収穫前日まで	2回以内	2回以内			
はくさい	コナガ アオムシ	1000~2000		収穫14日前まで	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計3回以内)			
	カブラハバチ アブラムシ類	4000							
だいこん	コナガ アオムシ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ	2000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内 (粒剤の処理は1回以内、 散布は1回以内)	散布		
	カブラハバチ アブラムシ類	2000~4000							
はつかだいこん	アブラムシ類	2000~4000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
かぶ	アブラムシ類	2000		収穫21日前まで	1回	1回			
	キスジノミハムシ アブラムシ類	2000							
わさびだいこん	カブラハバチ	4000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
チンゲンサイ	コナガ	2000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内 (粒剤の処理は1回以内、 散布は1回以内)	散布		
	アブラムシ類 キスジノミハムシ カブラハバチ	4000							
おかひじき	アブラムシ類			収穫14日前まで	1回	1回			
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類 キスジノミハムシ カブラハバチ	4000		収穫7日前まで	1回	1回			
なばな類	アブラムシ類 キスジノミハムシ			収穫7日前まで	3回以内	(粒剤の株元散布は1回以内、 散布は3回以内)			
レタス	アブラムシ類 ナモグリハエ	2000~4000		収穫7日前まで	1回	2回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、 散布は1回以内)			
非結球レタス	アザミウマ類	4000		収穫7日前まで	1回	2回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、 散布は1回以内)			
なすな ははこくき				収穫7日前まで	1回	1回			
みつば	アブラムシ類	8000		収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで	1回	1回			
ほうれんそう	アブラムシ類			収穫14日前まで	2回以内	2回以内			
しゅんぎく	アブラムシ類			収穫3日前まで	3回以内	3回以内			
チャービル ティル(葉)	アブラムシ類			収穫21日前まで	3回以内	3回以内			
タラゴン	アブラムシ類	4000		収穫14日前まで	2回以内	2回以内			
モロヘイヤ	コナジラミ類			収穫21日前まで	1回	1回			
セルリー	アザミウマ類		4000	収穫7日前まで	2回以内	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内)			
	ナモグリハエ								
くちしや ふだんそう エンサイ	アブラムシ類			収穫7日前まで		2回以内			
しそ しそ(花穂)				収穫14日前まで	2回以内	3回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、 散布及びくん煙は合計2回以内)			
ふき	コナジラミ類	3000		収穫前日まで	3回以内	3回以内			
にら	アブラムシ類	4000		収穫14日前まで	1回	1回			
らっきょう	アザミウマ類		100~300	収穫7日前まで	3回以内	2回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、散布、くん煙および定植後の 株元散布は合計3回以内)			
トレビス	アブラムシ類	2000							
にんにく	アザミウマ類 ネギコガ	2000~4000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
ししとう	アブラムシ類	8000		収穫7日前まで	2回以内	3回以内 (定植後の土壌混和は1回以内 散布は2回以内)			
とうがらし類 (ししとうを除く)				収穫7日前まで	2回以内	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内)			
きゅうり	コナジラミ類 ウリノメイガ	2000		収穫前日まで	3回以内	5回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、2%粒剤の定植後の 株元散布は1回以内、 散布、くん煙及び1%粒剤の 株元散布は合計3回以内)			
	ウリハムシ	4000							
うり類 (漬物用)	アブラムシ類 アザミウマ類	2000~4000		収穫7日前まで		3回以内			
にがうり	アブラムシ類	4000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
まくわうり	アブラムシ類 ウリハムシ	2000~4000		収穫7日前まで	2回以内	3回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、 散布及び定植後の株元散布は 合計2回以内)			
	カボチャハエ ウリノメイガ	2000							
メロン	アブラムシ類	8000		収穫3日前まで	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの 処理は1回以内、 散布及びくん煙および定植後の 株元散布は合計3回以内)			
すいか	ウリノメイガ コナジラミ類	2000		収穫7日前まで	3回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの 処理は1回以内、 散布及びくん煙および定植後の 株元散布は合計3回以内)			
	アブラムシ類 アザミウマ類	2000~4000							
なす	ウリハムシ	4000		収穫7日前まで	2回以内	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、散布、くん煙及び定植後 の株元散布は合計3回 以内)			
	アブラムシ類 テントウムシダマシ類 アザミウマ類 コナカイガラムシ類	2000~4000							
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	4000		収穫7日前まで	2回以内	3回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、散布、くん煙及び定植後 の株元散布は合計3回 以内)			
	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	2000							
トマト	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	4000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
アスパラガス	ジュウシホシクビナガハムシ カメムシ類	200	※	定植前	1回	3回以内 (苗床灌注は1回以内)	苗床灌注		
ねぎ	アザミウマ類	2000		収穫7日前まで	3回以内	3回以内 (は種時の土壌 混和は1回以内、定植時 の土壌混和及び定植 当日までの株元散布は 合計1回以内)			
たまねぎ				収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
わけぎ あさつき				収穫7日前まで	3回以内	4回以内 (土壌混和は1回以内、 散布は3回以内)			
オクラ	アブラムシ類	4000		収穫7日前まで	2回以内	3回以内			
いちご	カキノヒメヨコバイ チバロハチキネノコバエ	2000~4000		収穫前日まで	2回以内	3回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、 散布及び くん煙は合計2回以内)			
	アザミウマ類 コナジラミ類	2000							
食用ぎく	アザミウマ類	2000		収穫14日前まで	2回以内	2回以内			
食用ゆり		2000~8000		収穫前日まで	4回以内	4回以内			
食用ニバラ		4000~8000		収穫3日前まで	3回以内	3回以内			
しょくようほおずき				収穫14日前まで	2回以内	2回以内			
食用花 (食用ぎく、 食用ニバラ、 食用金魚草、 食用プリムラを除く)	アブラムシ類	8000		収穫14日前まで	1回	1回			
食用金魚草 食用プリムラ				収穫14日前まで	3回以内	3回以内			
てんさい	テンサイトビハムシ テンサイモグリハナバエ	200	※	定植前	1回	3回以内 (苗床灌注は1回以内)	苗床灌注		
ばれいしょ	ジャガイモガ	2000		収穫7日前まで	3回以内	4回以内 (播付時の土壌 混和は1回以内、播付後 は3回以内)			
	テントウムシダマシ類	2000~4000							
かんしょ	アブラムシ類	2000~6000		収穫前日まで	3回以内	3回以内			
	ヨツモンカメノコハムシ	4000							
やまのいも (種芋栽培)	アブラムシ類 アザミウマ類 ナガイモコガ	4000		収穫7日前まで	5回以内	5回以内			
やまのいも (むかご)				収穫21日前まで	2回以内	2回以内			
大豆 (未成熟ただし、 えだまめ、 さやいんげん、 さやえんどう を除く)	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類	4000		収穫7日前まで	3回以内	4回以内 (は種時または定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は3回以内)	散布		
	アブラムシ類 アザミウマ類	2000~4000							
えだまめ	コナジラミ類 アザミウマ類 アブラムシ類 フタスジヒメハムシ マメシクイガ	4000		収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
さやえんどう	アブラムシ類	2000~4000		収穫前日まで	2回以内	2回以内			
さやいんげん	コナジラミ類 アザミウマ類 カメムシ類	4000		収穫前日まで	2回以内	3回以内 (は種時または定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は3回以内)	散布		
	アブラムシ類	2000~4000							
だいず	マメシクイガ フタスジヒメハムシ	2000~4000		収穫14日前まで	2回以内	3回以内 (は種時または定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は3回以内)	散布		
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 カメムシ類	2000~4000							
いんげんまめ	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 カメムシ類	2000~4000		収穫14日前まで	2回以内	2回以内			
大豆 (種実、ただし、 だいず、いんげんまめ を除く)	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	4000		収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
さんしょう(葉)	アブラムシ類 アザミウマ類	4000	200~700	収穫45日前まで	6回以内	6回以内			
さんしょう(果実)	アブラムシ類 アザミウマ類	4000	20	1回	1回	4回以内 (散布は1回以内 樹幹散布は3回以内)	樹幹散布		
麦類	ゴマダラカミキリ幼虫	2000	60~150	3回以内	2回以内	2回以内			
メキャベツ		4000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
非結球メキャベツ				収穫7日前まで	1回	1回			
つるな レモンバーム	アブラムシ類	4000~8000		収穫7日前まで	2回以内	3回以内 (土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)			
	アブラムシ類	4000~8000							
セージ	アブラムシ類			収穫14日前まで	3回以内	3回以内			
バジル タイム				収穫21日前まで	3回以内	3回以内			
マジヨラム				収穫14日前まで	3回以内	3回以内			
オレガノ はっか		8000		収穫7日前まで	1回	1回			
パセリ				収穫3日前まで	1回	1回			
アマランサス(莖葉)	シロオビノメイガ			発生初期	5回以内	5回以内			
とうき	アブラムシ類	2000		発生初期	2回以内	2回以内			
なでてん(葉)	アザミウマ類	4000		収穫21日前まで	2回以内	2回以内			
にんじん あしたば	アブラムシ類 キアゲハ	4000		収穫前日まで	3回以内	3回以内			
クレソン	アブラムシ類			収穫3日前まで	2回以内	2回以内			
さるなし	クワシロカイガラムシ	2000	200~700	収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
なたね	アブラムシ類	4000		収穫45日前まで	1回	1回			
びやくし	アゲハ類	2000~4000	100~300	発生初期	5回以内	5回以内			
おげら	アブラムシ類			発生初期	2回以内	2回以内			
わらび	ルイズコメツキモドキ			収穫前日まで	2回以内	2回以内			
茶	チャノキオアザミウマ チャノホソコガ チャノミドリヒメヨコバイ	4000	200~400	摘採7日前まで	1回	1回			