

フェニックスフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルベンジアミドを 含む農薬の 総使用回数
りんご	ハマキムシ類 キンモンホソガ ケムシ類 ギンモンハモグリガ	4000～6000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ヒメボクトウ オオタバコガ ヨトウムシ	4000					
なし	ハマキムシ類	4000～6000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	シンクイムシ類 ケムシ類 フタモンマダラメイガ ヒメボクトウ	4000					
すもも	コスカシバ	200	5～200	開花期まで	1回	樹幹部及び 主枝に散布	3回以内 (樹幹散布は1回以 内、散布は2回以 内)
	シンクイムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類 コスカシバ	4000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	ケムシ類 コスカシバ	4000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
うめ	ケムシ類	200	5～200	開花期まで	1回	樹幹部及び 主枝に散布	3回以内 (樹幹散布は1回以 内、散布は2回以 内)
	コスカシバ						
もも ネクタリン	ハマキムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 ケムシ類	4000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (樹幹散布は1回以 内、散布は2回以 内)
	コスカシバ	200～500	5～200	開花期まで	1回	樹幹部及び 主枝に散布	
おうとう	ケムシ類	4000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (樹幹散布は1回以 内、散布は2回以 内)
	ハマキムシ類	4000～6000					
	ハスモンヨトウ ケムシ類 ハマキムシ類 モンキクロノメイガ ミノガ類 ホソオビツチイロノメイガ	4000					
かき	スカシバ類	500	5～200	開花期まで	1回	樹幹部及び 主枝に散布	3回以内 (樹幹散布は1回以 内、散布は2回以 内)
	フタモンマダラメイガ	200	5～200				
	カキノヘタムシガ イラガ類 ハマキムシ類 ヒメコスカシバ フタモンマダラメイガ ケムシ類 ハスモンヨトウ	4000	200～700				
くり	モモノゴマダラノメイガ クスサン	40	2～4	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内
かんきつ	アゲハ類 ハスモンヨトウ ハマキムシ類 ケムシ類 ヨモギエダシャク	4000	200～700			無人航空機 による散布	2回以内
キウイフルーツ	スカシバ類 ハマキムシ類 キイロマイコガ	4000	200～700	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ケムシ類	4000	200～700				
ブルーベリー	オオタバコガ	4000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
だいち	ハスモンヨトウ オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	16～32	0.8	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
		20～40	1				
		32～40	1.6				
	ハスモンヨトウ	2000～4000	100～300				
	ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	4000	100～300				
えだまめ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	16～32	0.8	収穫前日まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
		20～40	1				
		32～40	1.6				
	ハスモンヨトウ	2000～4000	100～300				
	オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	4000	100～300				
てんさい	ヨトウムシ	32	1.6	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内
		40	2.0				
		64	3.2				
		4000～6000	100～300				
茶	チャノホソガ	2000～4000	200～400	摘採7日前まで	1回	散布	1回
	チャハマキ チャノコカクモンハマキ シャクトリムシ類 ハスモンヨトウ	2000					
	チャドクガ ミノガ類	4000					
さくら	ケムシ類		200～	発生初期	2回以内	散布	2回以内