

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
		使用量	希釈水量				
きゅうり	アブラムシ類	400株当たり 25ml	400株当り 20～200L (1株当たり50～500ml)	定植直後	1回	株元灌注	4回以内 (定植時までの 処理及び定植直後の株 元灌注は合計1回以内、 定植後の散布は 3回以内)
			400株当り 2～20L (1株当たり5～50ml)	育苗期後半～ 定植当日		灌注	
ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400株当り10～20L (1株当たり25～50ml)		定植直後				
アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 トマトキバガ				400株当り 20～200L (1株当り 50～500ml)		定植直後	
コナジラミ類	400株当り10～20L (1株当り25～50ml)		育苗期後半～ 定植当日				
アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類				400株当り200L (1株当り500ml)		定植直後	
ピーマン	コガネムシ類		400株当り10～20L (1株当り25～50ml)				
アブラムシ類	400株当り10L～20L (1株当り25～50ml)			育苗期後半～ 定植当日		灌注	
なす		ネキリムシ類 ハモグリバエ類 アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400株当り200L (1株当り500ml)		定植直後		株元灌注
	アブラムシ類	400株当り10～20L (1株当り25～50ml)		育苗期後半～ 定植当日		灌注	
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400株当り 10～20L (1株当り 25～50mL)		育苗期後半～ 定植当日		灌注
	アブラムシ類	400株当り 200L (1株当り 500mL)		定植直後		株元灌注	
ししとう	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類		400株当り10L (1株当り 25ml)		育苗期後半～ 定植当日		灌注