

ベリマーク SC

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数				
キャベツ	ヨトウムシ ネキリムシ類 ウワバ類	400	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1 冊(約30X60cm、使用土 壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~ 定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の 処理は3回以内)				
	シロイチモジヨトウ コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 ハイマダラノメイガ										
ブロッコリー	アザミウマ類 アブラムシ類 ハイマダラノメイガ										
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ アオムシ							1回			
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 シロイチモジヨトウ							4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の 処理は3回以内)			
レタス 非結球レタス	オオタバコガ ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバイ ウワバ類 シロイチモジヨトウ							コオロギ類	定植当日	1回	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の 処理は3回以内)
	コオロギ類										
しそ	アブラムシ類							1回			
ねぎ	タマネギバエ タネバエ							2000	0.5L/m ²	育苗期後半~ 定植当日	4回以内 (定植時までの処理1回以 内、 定植後の処理は3回以内 (但し、株元灌注は1回以 内))
	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類										
ほうれんそう	ハスモンヨトウ	4000	0.1L/m ²	収穫7日前まで	1回						
	シロオビノメイガ アブラムシ類										
非結球あぶらな科 葉菜類	アオムシ コナガ アブラムシ類	0.2L/m ²									
いちご	ハスモンヨトウ	1000	25~50ml/株	育苗期後半	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)					
	アザミウマ類 コナジラミ類 コガネムシ類		50ml/株	育苗期後半~ 定植当日							
	アブラムシ類		25~50ml/株								