プリンスフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フィプロニルを含む農薬の総使用回数
なたね	コナガ	3000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
キャベツ	ハイマダラノメイガ コナガ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30x60cm、使用土壌約3～4L) 当り0.5L	定植前まで		灌注	3回以内 (定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ タマナギンウワバ オオタバコガ キスジノミハムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	
はくさい	ハイマダラノメイガ コナガ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30x60cm、使用土壌約3～4L) 当り0.5L	定植前まで	1回	灌注	
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ タマナギンウワバ オオタバコガ キスジノミハムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	
チンゲンサイ	コナガ	2000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	
カリフラワー				収穫14日前まで			
ブロッコリー	コナガ ハイマダラノメイガ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30x60cm、使用土壌約3～4L) 当り0.5L	定植前まで	1回	灌注	3回以内 (定植前の処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)
		2000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	
未成熟とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ			収穫14日前まで			2回以内
てんさい	テンサイトビハムシ	50倍	ペーパーポット1冊当り1L(3L/m ²)	定植前まで	1回	苗床灌注	1回
ストック	コナガ	2000倍	100～300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
きく カーネーション	アザミウマ類 オオタバコガ						
ばら	ミカンキイロアザミウマ チュウレンジハバチ						