

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農家の総使用回数					
福	-	カメムシ類	2000倍					4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)					
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000倍										
水田作物 畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類		60～150L/10a	-	3回以内							
とうもろこし(子実)	-	ムギクビレアブラムシ カメムシ類		100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内					
未成熟とうもろこし		アブラムシ類 カメムシ類											
もも ネクタリン		モモチョッキリノリウムシ アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類	2000倍										
おうとう		オウトウシヨウジョウハエ カメムシ類											
かき		カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ アザミウマ類											
マンゴー		チャノキイロアザミウマ											
小粒核果類		アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類											
オリーブ		カメムシ類											
オリーブ(葉)													
ぶどう		カメムシ類 フトテンヒメヨコバイ	3000倍										
あけび(果実)		チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～2000倍										
キウイフルーツ		カメムシ類	1000～2000倍										
びわ		カメムシ類 ビワキジラミ											
りんご		アブラムシ類 キンモンホソガ シンクイムシ類 キンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類	2000倍										
なし		アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 チュウゴクナシキジラミ											
かんきつ(苗木)		ミカンハモグリガ	50倍						100mL/株	育苗期	5回以内	株元灌注	5回以内
かんきつ		チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	1000～2000倍						200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		ゴマダラカミキリ	1000倍										
		アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コオハラムシ ケシキスエ ミカンバエ	2000倍										
		アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノドリヒメヨコバイ アオハハゴロモ	2000倍										
ばれいしょ	ワタアブラムシ			100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内						
かんしょ	アブラムシ類 コナジラミ類				収穫3日前まで	1回	1回						
トマト ミニトマト	カメムシ類	2000倍			収穫前日まで	2回以内	5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)						
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	100倍		セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L	鉢上時又は定植時	1回	灌注	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)					
	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
はくさい	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫前日まで	2回以内	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)						
ピーマン なす	アブラムシ類	3000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)					
	アザミウマ類 カメムシ類	2000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)					
すいか	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍	100～300L/10a		収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)					
とうがらし類	アブラムシ類	3000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)					
とうがらし(葉)	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)					
	アザミウマ類 コナジラミ類	2000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は1回以内、散布は2回以内)					
かぼちゃ	アブラムシ類	100倍		セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L	定植前日～定植時	1回	灌注	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は1回以内、散布は2回以内)					
にがうり	コナジラミ類				収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)					
セルリー	アブラムシ類	2000倍			収穫14日前まで	2回以内	散布	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)					
うり類(漬物用)	コナジラミ類 アザミウマ類				収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)					
	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)					
きゅうり	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)					
まくわうり	アザミウマ類 ウリハムシ カメムシ類	2000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内					
	アブラムシ類	3000倍			収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)					
メロン	アザミウマ類	2000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)					
キャベツ	アブラムシ類 コナガ アオアシ ハイマダラノメイガ	50～100倍		セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3L)当り0.5L	定植前日～定植時	1回	灌注	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)					
	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫3日前まで	2回以内	散布	5回以内(但し、は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は及び無人航空機散布合計2回以内)					
だいこん	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、生育期の無人航空機散布及び定植後の株元散布は2回以内)					
	アザミウマ類	2000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、生育期の無人航空機散布及び定植後の株元散布は2回以内)					
わさび	アブラムシ類 ナトビハムシ	2000倍			育苗期	3回以内	株元灌注	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
	アブラムシ類	3000倍			収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元灌注は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)					
レタス 非結球レタス	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
	アブラムシ類 ナモグリハエ	50～100倍			定植前日～定植時	1回	灌注	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、生育期の無人航空機散布及び定植後の株元散布は2回以内)					
ねぎ	アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a		収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、生育期の無人航空機散布及び定植後の株元散布は2回以内)					
	アブラムシ類 ハモグリハエ類 シロイチモジヨトウ タネバエ ネギコガ	400倍	0.4L/㎡		生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元灌注	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
わけぎ	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫3日前まで	2回以内	散布	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)					
	アザミウマ類	400倍	0.4L/㎡		生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元灌注	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
にんじん	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a		収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元灌注は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)					
	アブラムシ類 トビロヒョウタンゾウムシ クロバネキノコバエ アザミウマ類	400倍	0.4L/㎡		生育期 但し、収穫21日前まで	1回	株元灌注	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
しゅんぎく	アブラムシ類	3000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時および定植時の土壌混和及びは合計1回以内、散布は2回以内)					
チンゲンサイ	アブラムシ類	2000倍			収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
ほうれんそう	アブラムシ類 ウリハムシモドキ	3000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
非結球あぶらな科 葉菜類(チンゲンサイ、 畑わさびを除く)かぶ	アブラムシ類	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
畑わさび	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
だいず	アブラムシ類 ダイズサヤタマバエ	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
あずき	アブラムシ類	3000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
豆類(未成熟、ただし、 えだまめ、さやいんげん、 さやえんどう、実えんどう、 熟えんどう、未成熟そらまめを除く)	アブラムシ類 ハモグリハエ類	2000倍	100～300L/10a		収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
えだまめ	アブラムシ類 ハモグリハエ類 ダイズサヤタマバエ	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
未成熟ささげ	アブラムシ類 ハモグリハエ類	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
未成熟そらまめ	アブラムシ類 ハモグリハエ類	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
実えんどう さやえんどう	アブラムシ類 ハモグリハエ類 ウラナシジミ カメムシ類	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
さやいんげん	アブラムシ類 ハモグリハエ類 カメムシ類	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
モロヘイヤ	アザミウマ類	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
オクラ	アブラムシ類 フトテンミドリヒメヨコバイ	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
しょうが	クロバネキノコバエ類	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
らっきょう	アザミウマ類	2000倍			収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
にら	ネギアザミウマ	400倍	0.4L/㎡		生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元灌注	3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)					
	クロバネキノコバエ類	1000倍	1L/㎡		生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元灌注	3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)					
アスパラガス	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
	アザミウマ類 ジュウシホシクビナガハムシ コナジラミ類 カメムシ類	2000倍	100～300L/10a		収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
てんさい	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ カメコハムシ	2000～3000倍	100～300L/10a		収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100～200倍	5L/ペーパーポット6冊(2.5L/㎡)		移植前	1回	灌注	3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内)					
きゅうり(葉)	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
きゅうり(花)	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
バジル	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
しそ科葉菜類(しそ、 バジルを除く) しそ(花穂)	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
しよくようほおずき 食用ミニバラ 食用カーネーション 食用ハジメ 食用トレンシア 食用なでしこ 食用プリムラ 食用エキサガム 食用せんいちこ	アブラムシ類 コナジラミ類	3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
食用コスモス	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a		収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
食用ぎく	アブラムシ類 ウリハムシモドキ	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
しそ	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
なんてん(葉)	アブラムシ類	2000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
すいぜんじな	アブラムシ類	2000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
アマランサス (莖葉)	アブラムシ類	3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
ふき	コナジラミ類	2000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
せり	アブラムシ類	2000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
せり(水耕栽培)	アブラムシ類	2000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
茶	チャノホソガ チャノドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ ツマクアブラムシ	2000倍	200～400L/10a		摘採7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
	アブラムシ類 カンシヤコバネナガカメムシ サトウキ ビチアザミウマ	2000倍	100～300L/10a		収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
いね科牧草	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
花き類・観葉植物(きくを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
きく	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a		発生初期	5回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
	ハモグリハエ類	1000～2000倍	1L/㎡		発生初期	5回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)					
樹木類(つじ類、つばき類を除く)	ケムシ類	2000倍	100～700L/10a		発生初期	5回以内	散布	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、育苗期の株元散布は					