

トランスフォームフロアブル

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	スルホキサフロル を含む農業の 総使用回数	
りんご	アブラムシ類	2000~4000	200~700	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	リンゴワタムシ カイガラムシ類 コアオカスミカメ	1000~2000						
なし	アブラムシ類	2000~4000						
	カイガラムシ類	1000~2000						
かんきつ	アブラムシ類	2000						
	カイガラムシ類 アザミウマ類	1000~2000						
	ゴマダラカミキリ成虫	2000						
アブラムシ類								
もも ネクタリン	アブラムシ類	2000						
	カイガラムシ類	1000~2000						
小粒核果類	アブラムシ類	2000						
	カイガラムシ類	1000~2000						
おうとう	コアオカスミカメ							
ぶどう	カイガラムシ類		収穫7日前まで					
かき			収穫14日前まで					
キウイフルーツ		収穫前日まで						
マンゴー		収穫3日前まで						
マンゴー		収穫3日前まで						
キャベツ	ネギアザミウマ	2000	収穫前日まで					
ほうれんそう	アブラムシ類		収穫14日前まで					
しそ			収穫7日前まで					
だいこん レタス 非結球レタス 非結球あぶらな科葉 菜類 ブロッコリー			収穫前日まで					
未成熟とうもろこし	コナジラミ類		収穫3日前まで					
はくさい								
きゅうり なす ピーマン	コナジラミ類	1000~2000	2回以内					
いちご	アブラムシ類	2000	3回以内					
トマト ミニトマト			2回以内					
トマト ミニトマト	コナジラミ類 トマトサビダニ	1000~2000	収穫前日まで					
みょうが(花穂)	アブラムシ類	2000	100~300	3回以内	3回以内	散布、但し 花穂の発生 期にはマルチ フィルム被覆 により散布 液が直接花 穂に飛散し ない状態で 使用する。	3回以内	
食用ぎく								収穫3日前まで
ばれいしょ		32	3.2	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内	
やまのいも		2000	100~300	収穫3日前まで				散布
		32	3.2					無人航空機 による散布
ごぼう		2000	100~300	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
きく		アザミウマ類		1000~2000				発生初期
つつじ類		ツツジゲンバイ		2000				