

トルネードエース DF

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブ及びインドキサカルブMPを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000	100～300L/10a			散布	
	ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ	10	1～2L/10a			無人航空機による散布	
	コナガ アオムシ	1000～2000	100～300L/10a				
はくさい	コナガ アオムシ	1000～2000	100～300L/10a	収穫7日前まで		散布	
	ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 シロイチモジヨトウ ウワバ類	2000				無人航空機による散布	
	ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 シロイチモジヨトウ コナガ アオムシ ウワバ類	10倍				1～2L/10a	
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類	2000	100～300L/10a	収穫21日前まで		散布	2回以内
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	20	1～2L/10a	収穫14日前まで		無人航空機による散布	
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000 10	100～300L/10a 1～2L/10a			散布 無人航空機による散布	
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000	100～300L/10a	収穫前日まで		散布	
なす	ハスモンヨトウ オオタバコガ テントウムシダマシ類						
トマト	トマトキバガ ハスモンヨトウ						
ピーマン	オオタバコガ						
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 シロイチモジヨトウ	20	1～2L/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布	
えだまめ	ハスモンヨトウ	2000	100～300L/10a			散布	
だいず		8～16	800ml/10a			無人航空機による散布	
かんしょ	ハスモンヨトウ	2000	100～300L/10a			散布	
	ナカジロシタバ	20	1～2L/10a			無人航空機による散布	
さといも	ハスモンヨトウ	2000	100～300L/10a			散布	
		20	1～2L/10a			無人航空機による散布	
しょうが	ハスモンヨトウ	2000	100～300L/10a		3回以内	散布	3回以内
	アワノメイガ	20	1～2L/10a			無人航空機による散布	
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ	2000	100～180L/10a	収穫10日前まで	1回		1回
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ シロイチモジヨトウ		100～300L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内
樹木類(さくらを除く)	ケムシ類		200～700L/10a				
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000	200～500L/10a	成虫発生初期			