

プロフレア SC

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフラニリドを含む農薬の総使用回数					
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ シロイチモジヨトウ	2000～4000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内					
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ シロイチモジヨトウ											
だいこん	コナガ ヨトウムシ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ											
かぶ	コナガ キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ アオムシ ハスモンヨトウ ダイコンハムシ											
はなやさい類	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウワバ類 ハイマダラノメイガ オオタバコガ シロイチモジヨトウ											
非結球あぶらな科 葉菜類	コナガ アオムシ キスジノミハムシ											
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ											
ねぎ	ネギコガ シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ											
えだまめ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ マメシクイガ ツメクサガ ウコンノメイガ							16～32倍	0.8～ 1.6L/10a			無人航空機 による散布
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ ヒルガオハモグリガ エビガラスズメ							2000～4000倍	100～ 300L/10a			散布
		16～32倍	0.8～ 1.6L/10a			無人航空機 による散布						
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000～4000倍	100～ 300L/10a	発生初期		散布						