

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む 農薬の総使用回数			
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ コアオハナムグリ ケシキスイ類 アゲハ類 コナジラミ類 アザミウマ類 カメムシ類 カイガラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンバエ	2,000 ～4,000	200 ～700	収穫14日 前まで	3回以内	散 布	3回以内			
	ゴマダラカミキリ	200 ～400	30 ～ 75			主幹から 株元に散布				
びわ	アブラムシ類	4,000	200 ～700	収穫前日 まで		2回以内	散布	2回以内		
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ			収穫7日 前まで						
アスパラガス	アザミウマ類 カメムシ類			収穫前日 まで						
ばれいしょ	テントウムシダマシ類 ナストビハムシ	2,000 ～4,000	100 ～300	収穫7日 前まで	3回以内	無人航空機 による散布	4回以内 (植付時の土壌混和 は 1 回 以 内、 植付後は3回以内)			
	アブラムシ類	2,000 ～6,000						25		
		1,000	3.2							
		64								
やまのいも	4,000	100～300	収穫21日前 まで	2回以内	散布	3回以内				
やまのいも (むかご)										
麦 類		ムギハモグリバエ	60 ～150			収穫7日 前まで	3回以内	無人航空機 による散布	2回以内	
とうもろこし (子実)	アブラムシ類	4,000 ～6,000	100 ～300	収穫14日 前まで	3回以内					
				収穫前日 まで						
未成熟 とうもろこし			64	3.2		収穫14日前 まで				
てんさい	テンサイトビハムシ	200	ペーパー ポット 1冊当り1ℓ (3ℓ /㎡)	定植前		1回	苗床灌注	3回以内 (苗床灌注は 1回以内)		
	アブラムシ類 テンサイトビハムシ ヨトウムシ カメノコハムシ	4,000	100 ～300	収穫3日前ま で	3回以内	散布				
ね ぎ	アザミウマ類	2,000 ～3,000	100 ～300	収穫7日前 まで			3回以内 (は種時の土壌混和 は1回以内、植付時 の土壌混和及び 定植当日までの株元 散布は合計1回以内)			
たまねぎ										
豆類(種実) (ただし、だいず、 あずき、いんげん まめを除く)	アブラムシ類	4,000		収穫14日前 まで				3回以内		
だいず	アブラムシ類 カメムシ類 マメシンクイガ フタスジヒメハムシ	2,000 ～4,000								
あずき	ノメイガ類	2,000							収穫7日前 まで	3回以内
	アブラムシ類 マメホソクチゾウムシ	2,000 ～4,000								
いんげんまめ	アブラムシ類			4,000				収穫7日前 まで		
豆類(未成熟) (ただし、えだまめ さやいんげん、さや え ん どう を 除 く)										
えだまめ		カメムシ類 マメシンクイガ フタスジヒメハムシ								
さやいんげん さやえんどう にんじん	アブラムシ類			収穫7日前 まで					3回以内	
はくさい	コナガ アオムシ	2,000		収穫14日前 まで				5回以内	4回以内 粒剤の定植 時までの 処理は1回 以内、散布 及び定植 後の株元 散布は合計 3回以内	
	アブラムシ類	2,000 ～4,000								
ブロッコリー	コナガ アオムシ	2,000								収穫7日前 まで
	アブラムシ類	4,000								
キャベツ	コナガ アオムシ キスジノミハムシ	2,000	収穫14日 前で	2回以内	3回以内 粒剤の定植時までの 処理は1回以内、散布 及び定植後の株元 散布は合計2回以内					
	アブラムシ類	2,000 ～ 4,000								
だいこん	コナガ アオムシ	2,000				2回以内	1回			
はつかだいこん		4,000								
かぼちゃ	アブラムシ類	2,000 ～4,000	200 ～400	摘採7日前 まで	1回	1回				
茶	コミカンアブラムシ チャノホソガ ツマグロアオカスミカメ マダラカサハラハムシ	4,000	200 ～400	摘採7日前 まで	1回	1回				