

エコピタ液剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	還元澱粉糖化 物を含む農薬の 総使用回数
果樹類(かんきつを除く)	アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病	100倍	200~1000	収穫前日まで	—	散布	—
かんきつ	ミカンハダニ	100~300					
いちご	アブラムシ類、 ハダニ類 (ミカンハダニを除く) うどんこ病	100	100~300	定植前	—	10秒~1分 間苗浸漬	—
	野菜類 (いちご、 トマト、ミニトマ ト、きゅうり、なす を除く)	コナジラミ類					
トマト ミニトマト きゅうり なす	コナジラミ類	100~200	100~300	収穫前日まで	—	散布	—
	アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病	100					
ごま	アブラムシ類	100	—	—	—	—	—
とうもろこし	ムギクビレアブラムシ						
花き類・観葉植 物	アブラムシ類 ハダニ類	100~200	—	発生初期	—	—	—
	コナジラミ類 うどんこ病						
きく 食用ぎく	ハダニ類	100	—	定植前	—	10秒~1分 間苗浸漬	—