

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数		
			希釈倍数	使用液量 /10a						
稲	—	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	1000～ 2000 倍	60～ 150L	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内		
		カメムシ類 イネドロオイムシ	2000倍							
		イナゴ類 コブノメイガ	1000倍							
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	600倍	25L						
ばれいしょ		アブラムシ類	1000倍	100～ 300L	収穫7日前まで	3 回以内		3 回以内		
だいず えだまめ		マメシンクイガ ハスモンヨトウ カメムシ類			収穫14日前まで	2 回以内		2 回以内		
きゅうり		アブラムシ類 ウリノメイガ			収穫前日まで	3 回以内		3 回以内		
なす		アブラムシ類			収穫 3日前	3 回以内		3 回以内	3 回以内	
キャベツ		ハイマダラノメイガ アオムシ ヨトウムシ								
はくさい		アブラムシ類 ヨトウムシ								収穫 7日前 収穫21日前まで
だいこん		ヨトウムシ								収穫14日前まで
てんさい		ヨトウムシ								
つつじ類	ツツジゲンバイ									
樹木類 (つつじ類、 いぬまきを除く)	ケムシ類	2000～ 4000倍			100～ 700L	発生初期	6回以内	6回以内		
いぬまき	ケブカトラカミキリ									
水田作物、畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	2000倍	60～ 150L	—	3 回以内	3 回以内			