

トレボンEW

| 作物名 | 適用場所 | 適用病虫害名 | 希釈倍数 | 使用液量 (L/10a) | 使用時期 | 使用方法 | 本剤及びエトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
|--------------------|------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|------|---------------------------|
| 稲 | — | ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネドロオイムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ コブノメイガ | 1000倍 | 60～150 | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 |
| | | ウンカ類 ツマグロヨコバイ | 300倍 | 25 | | | |
| 麦類 | | アブラムシ類 | 1000倍 | 60～150 | 収穫7日前まで | | 2回以内 |
| とうもろこし | | ツマジロクサヨトウ | | 100～300 | | | 収穫14日前まで |
| 飼料用とうもろこし (子実) | | | | | アブラムシ類 | | |
| ばれいしょ | | マメシンクイガ ハスモンヨトウ カメムシ類 ツメクサガ | | | | | 収穫14日前まで |
| やまのいも | | | | | ウラナミシジミ シロイチモジヨトウ | | |
| だいず えだまめ | | コナジラミ類 アブラムシ類 | | | | | 収穫 前日まで |
| さやえんどう 実えんどう | | | | | アブラムシ類 | | |
| きゅうり | | アブラムシ類 | | | | | 収穫 3日前まで |
| すいか | | | | | コナジラミ類 | | |
| メロン | | アオムシ | | | | | 収穫前日まで |
| トマト | | | コナジラミ類 アブラムシ類 | | 収穫3日前まで | | |
| ブロッコリー | | アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ | | 収穫7日前まで | | | |
| なす | | | シロイチモジヨトウ | | 収穫21日前まで | | |
| キャベツ | | アブラムシ類 | | 収穫14日前まで | | | 2回以内 |
| はくさい | | | ヨトウムシ | | 収穫14日前まで | | |
| だいこん | | イモコガ | | 根株養成期但し、 収穫 45日前まで | | | 3回以内 |
| ねぎ | | | アブラムシ類 | | 根株養成期但し、 収穫 45日前まで | | 2回以内 |
| レタス | | シロイチモジヨトウ | | | | | |
| てんさい | | | アブラムシ類 ハスモンヨトウ | — | | | |
| エンサイ | | ケムシ類 | | | 2000倍 | | 100～700 |
| うど | | | ツツジゲンバイ | | | | |
| きく | | モンアシブトゾウムシ | | 1000倍 | | | |
| 宿根かすみそう | | | ケブカトラカミキリ ケムシ類 | | 2000倍 | | |
| たであい | | カメムシ類 | | 1000倍 | | | 60～150 |
| 樹木類 (つつじ類、いぬまきを除く) | | | | | | | |
| つつじ類 | | | | | | | |
| いぬまき | | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | | | | | |