

テッパン液剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	10a当り 散布液量 (L)	使用時期	本剤及びシクラ ニリプロールを 含む農薬の総 使用回数	使用方法
かんきつ	アゲハ類 アザミウマ類 ミカンハモグリガ コアオハナムグリ ケスキスイ類 ケムシ類 ミカンバエ成虫 ゴマダラカミキリ ハマキムシ類 クワノミハムシ	2000	200～700	収穫前日まで	2回以内	散布
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 コガネムシ類 カメムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ヒメボクトウ オオタバコガ					
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 カメムシ類 ヒメボクトウ チュウゴクナシキジラミ					
もも	シンクイムシ類 ハマキムシ類 コガネムシ類 カメムシ類 モモハモグリガ コスカシバ クビアカツヤカミキリ					
ネクタリン	ケムシ類					
小粒核果類	ケムシ類 ハマキムシ類 シンクイムシ類 クビアカツヤカミキリ モモヒメヨコバイ					
おうとう	ハマキムシ類 カメムシ類 オウトウショウジョウバエ マメコガネ コスカシバ クビアカツヤカミキリ					
ぶどう	ケムシ類 コガネムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ クビアカスカシバ ハマキムシ類					
かき	カキノヘタムシガ イラガ類 カメムシ類 ヒメコスカシバ ハマキムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ					
茶	チャハマキ チャノコカクモンハマキ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ ヨモギエダシヤク ツマグロアオカスミカメ マダラカサハラハムシ ナガチャコガネ成虫					
	チャノホソガ	1000～2000				