

ツインターボ箱粒剤 08

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアジニンを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
湛水直播 水稻	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	は種前	1回	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	4回以内(は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	3回以内(は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g			は種時(覆土前)～移植当日	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する	4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
	イネクロカメムシ		移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。		
	苗立枯細菌病 苗腐敗症(もみ枯細菌病菌)		は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する		
			は種時(覆土前)		育苗箱の上から均一に散布する。		
稲	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	移植時		側条施用	4回以内(直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	3回以内(直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)