Dr. オリゼフェルテラ粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法	本剤及びクロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
湛水直播水稲	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	1kg/10a	は種時	は種同時施薬機を用いて土中施用する	1回	2回以内 （移植時までの処理は1回以内）
稲			移殖時	側条施用		
稲 （箱育苗）	コブノメイガ	育苗箱 （30x60x3cm 使用土壌約5L） 1箱当り50g	移植当日	育苗箱の上から 均一に 散布する。		
	もみ枯細菌病 白葉枯病 内頴褐変病 イネヒメハモグリバエ		移植3日前～ 移植当日			
	いもち病 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ イネドロオイムシ イネネミズゾウムシ ニカメイチュウ イネツトムシ		緑化期～ 移植当日			
	コブノメイガ	高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)	移植当日			
	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病 内頴褐変病 イネヒメハモグリバエ ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ イネツトムシ		移植3日前～ 移植当日			