

ブイゲットパディート粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ コブノメイガ イナゴ類	高密度には種する場合は 1 kg/10a (育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約 5ℓ) 1 箱当り 50～100g)	緑化期～ 移植当日	1回	本剤の所定量を 育苗箱の上から 均一に散布する	1回	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、 本田での散布は 2回以内)
	イネツトムシ ヒメトビウンカ		移植3日前～ 移植当日				
稲	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	1kg/10a	移植時	1回	側状施用	1回	3回以内(直播での種時 又は移植時までの処理は1 回以内、本田での散布は2 回以内)
直播水稻	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ		は種時		は種同時施薬機を 用いて 土中施用する		3回以内 (は種時までの処理は 1回以内、 本田での散布は 2回以内)