

稲大将箱粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサゾスルフィルを含む農薬の総使用回数	インテアニルを含む農薬の総使用回数	インピルキサムを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時 (覆土前)	1回	育苗箱の上 から 均一に散布 する	1回	3回以内(移 植時までの 処理は1回 以内、本田 では2回以 内)	1回
		高密度には種する場 合は1kg/10a(育苗 箱(30×60×3cm、使 用土壌約5L)1箱当り 50~100g)						
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 白葉枯病 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ コブノメイガ イナゴ類	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時(覆土 前)~移植当 日	1回	育苗箱の上 から 均一に散布 する	1回	3回以内(移 植時までの 処理は1回 以内、本田 では2回以 内)	1回
		高密度には種する場 合は1kg/10a(育苗 箱(30×60×3cm、使 用土壌約5L)1箱当り 50~100g)						
稲	いもち病 紋枯病	1kg/10a	移植時		側条施用		3回以内(直 播での種 時または移 植時までの 処理は1回 以内、本田 では2回以 内)	