

粒状石灰窒素 40 (コープケミカル)

| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 石灰窒素を含む農業の総使用回数 | |
|------|------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|---|-----------------|---|
| 水稲 | — | ユリミズ | 40～60kg/10a | は種前又は植付前 | 1回 | 散布後土壌混和 | — | |
| | | ザリガニ | 20～30kg/10a | 植代前 | | 散布 荒起し後3～4cmに湛水し、3～4日後全面に散布、3～4日放置後植代を行う(漏水を防止すること) | | |
| | | スクミリンゴガイ | | | | 刈取後(水温15度以上の時期) | | 散布 3～4cmに湛水し、1～4日後に全面散布、3～4日放置する。(漏水を防止すること。) |
| | | ノビエの休眠覚醒(湿田及び半湿田) | 40～50kg/10a | 水稲刈取後1週間以内 | | 全面散布 | | |
| | | 水田1年生雑草 | 水田刈跡 | 30～70kg/10a | | は種前又は植付前 | | 散布 |
| | | | | 50～70kg/10a | | 水田作物刈取後 | | |
| れんこん | — | スクミリンゴガイ | 60～100kg/10a | 植付前 | 散布後土壌混和(7日間放置後植付を行う。) | | | |
| 野菜類 | | センチュウ類 | 50～100kg/10a | は種前又は植付前 | 散布後土壌混和 | | | |
| | | 1年生雑草 | 50～70kg/10a | | 散布 | | | |
| 麦類 | | はくさいキャベツ | 根こぶ病 | 100～200kg/10a | は種前又は植付前 | 散布後土壌混和 | | |
| 桑 | | | | | | | カイガラムシ類 胴枯病 | 温湯を10ℓ当り400～800g/10a |