

クレマートU粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	本剤及び ブタミホスを含む農薬の 総使用回数	
たまねぎ	一年生雑草	春播栽培の定植後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	5~7kg/10a	全面土壌散布	1回	
メロン 漬物用メロン すいか 漬物用すいか		秋播栽培の定植後(秋季の雑草発生前)但し収穫60日前まで	4~6kg/10a			
キャベツ		定植・マルチ前(雑草発生前)				
トマト		定植前~定植前後(雑草発生前)	5~6kg/10a	畦間株間土壌散布		
ねぎ わけぎ あさつき		定植活着後(雑草発生前)但し定植10日後まで		全面土壌散布		
やまのいも さといも にんにく		植付後萌芽前(雑草発生前)				
ばれいしょ		は種後発芽前(雑草発生前)				
らっかせい にんじん		一年生広葉雑草	全面土壌散布			
パセリ		一年生雑草	植付後又は培土後(雑草発生前)但し収穫120日前まで	4~6kg/10a		畦間株間土壌散布
こんにやく			挿苗後(雑草発生前)挿苗後3日まで			
かんしょ	定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで					
にら	定植前(雑草発生前)					
きゅうり	定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで		5kg/10a	湛水散布		
くわい	植付後出芽前(雑草発生前)					
せり	親株養成期(雑草発生前)		3~5kg/10a			
やまのいも(むかご)	植付後萌芽前(雑草発生前)		4kg/10a	全面土壌散布		
きく	定植後(雑草発生前)		4~6kg/10a			
つつじ類 さざんか	植付後又は生育期(雑草発生前)					
桑	春季桑発芽前及び夏季収穫後発芽前(雑草発生前)		8~10kg/10a			
たばこ (折衷マルチ栽培)	植付10日前まで(雑草発生前)		4kg/10a	1回		