

作物名	適用雑草名	使用時期	10aあたり使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数		
			薬量(ml)	希釈水量(L)					
陸稲	一年生雑草	は種後出芽前(雑草発生前)	200~400	70~150	1回	全面土壌散布	1回		
麦類(小麦を除く)									
小麦		300~500	70~100	雑草茎葉散布又は全面土壌散布					
ソルガム		ソルガム3葉期(雑草発生前~発生始期)				300			
とうもろこし 飼料用とうもろこし		は種後出芽前(雑草発生前)	300~400	70~150		全面土壌散布			
		かんしょ	挿苗10日後まで(雑草発生前)					100	畦間土壌散布
さといも		植付後萌芽前(雑草発生前)	200~400	70~100		全面土壌散布		2回以内(土寄せ後の処理は1回以内)	
			土寄せ後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	100					
ばれいしょ		植付後萌芽前(雑草発生前)	200~300	70~100					
やまのいも			200~400	100					
こんにゃく		植付後又は培土後(雑草発生前)但し植付30日後まで	200~300	70~100					
はくさい									
キャベツ カリフラワー レタス 非結球レタス		定植前(雑草発生前)	200~400	70~150					
ヤングコーン		は種後出芽前(雑草発生前)							
うど		定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前)	400				畦間土壌散布		2回以内(畦間処理は1回以内)
				生育期(根株養成圃)(雑草発生前)但し収穫60日前まで					
たまねぎ (直播栽培)		は種後~本葉2葉期(雑草発生前)	200~400	70~100		全面土壌散布	1回		
たまねぎ (移植栽培)		定植前(雑草発生前)	300~500	70~150					
								定植後(雑草発生前)但し収穫30日前まで	
葉たまねぎ		定植前(雑草発生前)							
らっきょう		植付後萌芽前(雑草発生前)							
ねぎ		定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで		70~100					
にら			200~300	100				畦間土壌散布	
		にんにく	植付前(マルチ前)	300~500				70~150	全面土壌散布
			植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで					70~100	
葉にんにく (マルチ栽培)		植付前(マルチ前)	400~500	70~150					
葉にんにく (マルチ栽培を除く)		植付前							
		植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	300~400	100					
らっかせい		は種後出芽前(雑草発生前)	200~300	70~100					
にんじん									
アスパラガス	萌芽前(雑草発生前)	200~400	70~100						
しょうが	植付後萌芽前(雑草発生前)								
ふき (春どり露地栽培)	春期収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)	400							
ふき(ふきのとう)				春期ふき収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)					
とりかぶと(薬用)	生育期(雑草発生前)但し収穫90日前まで	300~500	100						
おけら	収穫60日前まで(雑草発生前)	200~300	70~150	全面土壌散布	3回以内(1年間に1回以内)				
みしまさいこ とうすげぼうふう びやくし	は種後出芽前(雑草発生前)								
せんきゅう	萌芽後(雑草発生前)但し収穫120日前まで	300	100	1回	1回				
とうき いんちんこう	定植後(雑草発生前)但し収穫120日前まで								
甘草	は種後萌芽前(雑草発生前)	400~500	100	3回以内(1年間に1回以内)	3回以内(1年間に1回以内)				
	定植後(雑草発生前)但し、収穫90日前まで								
	越冬後萌芽前(雑草発生前)								
食用ぎく	定植前(雑草発生前)	200~400	70~150	1回	1回				
きく	定植後(雑草発生前)								
りんどう	萌芽前(雑草発生前)								
チューリップ	植付後萌芽前(雑草発生前)	300~500							
すぎ(床替床) ひのき(床替床)	床替後(雑草発生前)	400~500	100~200	2回以内	2回以内				
桑	春期発芽前又は夏切後(雑草発生前)	300~400							