

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用量 (kg)	本剤の使用 回数	使用方法	ベンディメタリン を含む農薬の 総使用回数	
麦類	一年生 雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	5~6	1回	全面土壌 散布	1回	
陸稲			4~6				
ソルガム							
とうもろこし 飼料用とうもろこし							5~6
ヤンゴコーン							
さといも		植付前 (雑草発生前)	4~6			2回以内(土寄せ 後の処理は1回以 内)	
		植付後萌芽前 (雑草発生前)					
		土寄せ後(雑草発生前)但し 収穫60日前まで					
ばれいしょ (マルチ栽培を除く)		植付後萌芽前 (雑草発生前)	4~6			1回	
ばれいしょ (マルチ栽培)		植付後マルチ前 但し萌芽前まで (雑草発生前)					
キャベツ		定植前又は 定植直後~定植翌日 (雑草発生前)	4~5				
はくさい レタス		定植前 (雑草発生前)	4~6				
アスパラガス		萌芽前 (雑草発生前)					
にんじん		は種後出芽前 (雑草発生前)	4~5				
パセリ		は種後出芽前 (雑草発生前)	5				
たまねぎ (春播栽培)		定植後(雑草発生前) 但し収穫30日前まで	5~6				
たまねぎ (秋播栽培)		定植後又は生育期 (雑草発生前) 但し収穫30日前まで					
たまねぎ (秋播マルチ栽培)		定植前(マルチ前)					
葉たまねぎ							
ねぎ		定植後(雑草発生前) 但し定植10日後まで	4~6				
しょうが		植付後萌芽前 (雑草発生前)					
にんにく 葉にんにく		植付前(マルチ前)					
		植付後(雑草発生前) 但し収穫60日前まで					
うど		定植後萌芽前(根株養成園) (雑草発生前)	5				2回以内(畦間処 理は1回以内)
		生育期(根株養成園) (雑草発生前) 但し収穫60日前まで					
こんにゃく		植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し植付30日後まで	5~6				1回
らっかせい		は種直後 (雑草発生前)	5				
桑		春期発芽前又は夏切後 (雑草発生前)	5~6				2回以内
いぐさ	畑苗代での定植後(雑草発 生前)(入水15日前まで)	4	1回	全面土壌 散布			
みしまさいこ	は種後~発芽期 又は萌芽期 (雑草発生始期まで)	3~5					
チューリップ	植付後萌芽前 (雑草発生前)	4~6			1回		
きく	定植後(雑草発生前)						
つつじ類	生育期 (雑草発生前)						