

作物名 (*)は適用場所	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用薬量 (ml)	10a当り 希釈水量 (L)	本剤使用 回数	グリホサートを含 む農薬の 総使用回数	ピラフルフェンエチ ルを含む農薬の 総使用回数	使用方法	
果樹類 (かんきつ、 パイナップルを 除く)	一年生及び 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	400～1000	100	3回以内	3回以内	3回以内	雑草茎葉 散布	
かんきつ						5回以内			
野菜類 (きゅうり、トマト、 なす、アスパラガス、 ほうれんそう、 たらのき、レタス、 オリーブ(葉)、 びわ(葉)、 ピーマン及び とうがらし類、 にんじん、 薬用にんじん、 だいこん、ねぎ、 たまねぎ、豆類(種実)、 えだまめ、かんしょを除 く)	一年生雑草	耕起前又は 定植 7 日前まで (雑草生育期)	400～600		1回	1回	1回		
らっかせい						3回以内			
きゅうり トマト なす アスパラガス ほうれんそう たらのき レタス オリーブ(葉) びわ(葉)		2回以内							
ピーマン及び とうがらし類 にんじん		10 回以内 (1年間に2 回 以内)							
薬用にんじん		2回以内							
だいこん					1回	2回以内	1回		
ねぎ					3回以内	3回以内	3回以内		
たまねぎ		1回							2回以内
麦類(小麦を除く)									
小麦		は種後出芽前(雑草生育期)			2回以内	2回以内			
多年生雑草		耕起前 (雑草生育期)					500～1000		
だいず		一年生雑草			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	400～600	2回以内		4回以内
	は種後出芽前 (雑草生育期)								
	耕起前または は種10日前まで (雑草生育期)		1回		3回以内		1回		
	かんしょ				2回以内				
水田作物(水田畦畔) (水田畦畔)*	一年生及び 多年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	500～1000		2回以内	3回以内	2回以内		
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲 直播水稲	一年生雑草	耕起20～10日前 (雑草生育期)			1回	2回以内	1回		
水田作物、 畑作物(休耕田) (休耕田)*	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期			2回以内	3回以内	2回以内		
水田作物 (水田刈跡)*	一年生雑草	雑草生育期	400～600		1回	1回	1回		
	多年生雑草		500～2000						
茶	一年生及び 多年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	400～600		2回以内	2回以内	2回以内		
きく	一年生雑草	耕起前または定植前まで (雑草生育期)							
牧草 (牧野・草地)*	一年生及び 多年生雑草	更新・造成10日前まで (雑草生育期)	400～750		1回	3回以内	3回以内		植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布
樹木等 (公園、庭園、堤とう、 道路、運動場、宅地、 鉄道、のり面等)*		雑草生育期	500～1000						
	スギナ	雑草生育期	1000～4000			3回以内			