

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジホップ及び フルアジホップPを 含む農薬の 総使用回数
だいず	—	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く) シバムギ レッドトップ	雑草生育期 (イネ科雑草8～10葉期) 但し、収穫60日前まで	100	100	1回	雑草茎葉散布 又は全面散布	1回
			雑草生育期 (イネ科雑草5～8葉期) 但し、収穫60日前まで					
			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫60日前まで	75～100				
えだまめ			雑草生育期 (イネ科雑草5～8葉期) 但し、収穫30日前まで	100	通常散布 50～100 少量散布 25～50			
			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫30日前まで	75～100				
あずき			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫60日前まで		50～100			
いんげんまめ			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫45日前まで					
にんじん			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫30日前まで	75～100				
だいこん			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫45日前まで					
てんさい			雑草生育期 (イネ科雑草3～8葉期) 但し、収穫90日前まで	50～100				
たまねぎ			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫30日前まで					
いちご(親株床)			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫後～定植まで	50～100	雑草茎葉散布			
トマト			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫21日前まで	75～100	雑草茎葉散布 又は全面散布			
かんしょ			雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) (但し収穫60日前まで)	50～75				
ばれいしょ			雑草生育期 (イネ科雑草3～8葉期) 但し、収穫前日まで	75～100				
キャベツ	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫30日前まで	100						
アスパラガス	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫前日まで	70～100	2回以内					
やまのいも	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫30日前まで		50～100					
にんにく	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫21日前まで	100						
ブロッコリー	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫30日前まで							
せんきゅう	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期) 但し、収穫90日前まで							
かんきつ	春季～夏季雑草生育期 (草丈20cm以下) 但し、収穫120日前まで	200～300	1回	雑草茎葉散布				
	チガヤ、ススキ等の 多年生イネ科雑草	300～500						
いぐさ	水田一年生イネ科雑草	落水後〔雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)〕	100～200	雑草茎葉散布 又 は全面散布 (落水)				
桑	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く) シバムギ レッドトップ	雑草生育期 (イネ科雑草3～5葉期)	75～100	100～150	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	
つつじ類 つばき類 とちのき さくら まつ しゃりんばい		雑草生育期 (草丈20cm以下)	100～200					
日本芝		ベントグラス	雑草生育期 (芝休眠期)	150	1回	散布	1回	
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生イネ科雑草 キシュウスズメノヒエ	雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫120日前まで	200～400				雑草茎葉散布
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 運動場、 道路、宅地、 のり面等	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (草丈20cm以下)	150～300	100	3回以内	植栽地を除く樹木 等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内
		多年生イネ科雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	400～600				