

アグロマックス水和剤

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)	本剤の使用回数	プロピザミドを含む農薬の総使用回数	使用方法
レタス(秋播栽培)	一年生雑草 (キク科、カヤツリグサ科を除く)	は種覆土後雑草発生前 但し、は種14日後まで	200~300	70~100	1回	1回	全面土壌 散布
		定植後雑草発生前 但し、定植14日後まで					
		定植前					
レタス(春播栽培)		定植後雑草発生前 但し、定植14日後まで					
キャベツ		定植直後雑草発生前	100				
しゅんぎく	は種後発芽前 雑草発生前	300	70				
たまねぎ(春播栽培)	一年生 イネ科雑草		200~300	100	2回以内	2回以内	
		300					
	定植後雑草発生前 但し、収穫45日前まで	200~300					
たまねぎ(秋播栽培)	一年生広葉雑草 (キク科、カヤツリグサ科を除く)			100	1回	1回	
ブロッコリー		定植後雑草発生前 但し、定植14日後まで					
ごぼう(べたがけ栽培)		は種後発芽前 雑草発生前	100~200				
ごぼう			200~300				
きく		定植後雑草発生前	200~400				
もりあざみ			150~200				
チコリ		は種後発芽前雑草発生前					
チコリ(根株)		定植後または 中耕後雑草発生前 但し、収穫60日前まで	300			2回以内	2回以内