

カソロン粒剤6.7

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	使用方法	本剤およびDBNを含む農薬の総使用回数
りんご	—	一年生雑草	春期の雑草発生始期	全土壌	8～12kg /10a	全面土壌散布	1回
		一年生雑草及び多年生広場雑草(まめ科を除く)スギナ	秋冬期の雑草発生前～発生始期		5～6kg /10a		
なしもも		ギンギン、ヨモギ、タンポポ、ヤブガラシ等の多年生広葉雑草	春期の雑草発生始期～生育期		8～10kg /10a	雑草の株元又は成長点に所要量を局所処理する	
桑	—	一年生雑草	雑草発生前～発生始期(春又は夏切直後)	砂土、赤黄色土壌を除く全土壌	6～8kg /10a	全面土壌散布	
水田作物畑作物(休耕田)		休耕田	水田一年生雑草マツバイ	4～7月の雑草発生前～発生始期	全土壌	全面土壌均一散布又は土壌混和处理	
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草および多年生広場雑草(まめ科を除く)スギナ	秋冬期～春期の雑草発生前～発生始期	4～6kg /10a		全面土壌散布	
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地のり面、鉄道等	一年生雑草	雑草発生前～発生始期	—	6～9kg /10a	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	3回以内
		多年生広葉雑草スギナ			10～15kg /10a		