

カソロン粒剤(2. 5)

作物名	適用場所	適用雑草	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	DBNを含む農薬の総使用回数
いぐさ	—	スズメノテッポウ ミズハコベ 水田一年生雑草 マツバイ	1～4月 (雑草発生始期)	壤土～埴土 (減水深0.5cm/ 日以下)	3～6kg/10a	2回以内	湛水散布	2回以内
しちとうい		水田一年生雑草 マツバイ ミズハコベ	移植後7～10日	腐植に富む 埴土 ～壤土(減水深 0.5cm /日以下)	3～4kg/10a			
日本芝		一年生雑草 多年生広葉雑草	秋期雑草発生 前～発生始期	壤土～埴土	8～10kg/10a (1㎡当り8～10g)			
水稻 (刈取跡)	水稻刈取跡	マツバイ	水稻刈取跡後 7～10日まで	5～6kg/10a	1回	1回		
樹木等	公園・庭園・堤とう 駐車場・道路・運 動場宅地 ・のり面等	一年生雑草	雑草の発生前～ 発生始期	—	17～20kg/10a (1㎡当り17～20g)	3回 以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に散布	3回以内
		多年生広葉雑草 スギナ			20～40kg/10a (1㎡当り20～40g)			