

キレダー(水和剤)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ACNを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
日本芝 (こうらいしば)	—	藻類 コケ類	藻類・コケ類の発生時	3~4kg/10a (3~4g/m ²)	200~300ℓ/10a (200~300ml/m ²)	3回以内	散布	3回以内
西洋芝(ベントグラス)		コケ類	冬期芝生育期 (コケ類の発生時)	2~4kg/10a (2~4g/m ²)				
花き類・ 観葉植物			コケ類生育期	2~4kg/10a	200~300ℓ/10a			
樹木等	公園 庭園 宅地 駐車場 運動場 道路等	イシクラゲ	イシクラゲ生育期	2~4g/m ²	(200ml/m ²)	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布		
		コケ類	コケ類生育期		100~1000mℓ/ m ²			

作物名	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	ACNを含む農薬の総使用回数
つつじ類 (鉢植え)	ゼニゴケ	ゼニゴケ生育期	500倍	鉢内土壌表面積1m ² 当り1ℓ	—	雑草茎葉散布	—