

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	イマザモックスアンモニウム塩を含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
あずき	一年生 広葉雑草	出芽直前～出芽揃期 (雑草発生始期～発生揃期)	200～ 300mℓ /10a	100ℓ /10a	1回	雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	2回以内 (畦間処理は 1回以内)
		生育期(雑草発生 揃期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草 茎葉散布	
いんげんまめ		出芽直前～出芽期 (雑草発生始期～ 発生揃期)				雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	
		生育期(雑草発生 揃期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草 茎葉散布	
だいず	一年生雑草	出芽直前～3葉期 まで(雑草発生始期 ～2葉期)	200～ 300mℓ /10a	100ℓ /10a	1回	雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	2回以内 (畦間処理は 1回以内)
		生育期(雑草発生 揃期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草 茎葉散布	
えだまめ	一年生 広葉雑草	出芽直前～出芽揃期 (雑草発生始期 ～発生揃期)	200～ 300mℓ /10a	100ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布又は 全面土壌 散布	1回
さやいんげん		出芽直前～出芽期 (雑草発生始期～ 発生揃期)				雑草茎葉散布又は 全面土壌散布	
おうぎ		出芽揃期(雑草発生 始期～発生揃期)				2回以内 (畦間処理は1回以 内)	
		生育期(雑草発生 揃期～2葉期) 但し、収穫60日前まで				畦間雑草茎葉散布	
甘草	一年生 広葉雑草	出芽前 (雑草発生始期)	200～ 300mℓ /10a	100ℓ /10a	1年間に 1回	雑草茎葉 散布又は 全面土壌	6回以内(1年間に 2回以内(畦間処理 は1回以内))
		萌芽前～萌芽揃期 (雑草発生始期～ 発生揃期)					
		生育期(雑草発生 揃期 ～2葉期) 但し、収穫60 日前まで				畦間雑草 茎葉散布	